

**Beitrag zur Analytik von Salben und Salbengrundlagen,
die für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7
vorgeschlagen wurden**

Hans Weigand



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555205_0061



BEITRAG ZUR ANALYTIK VON SALBEN UND SALBENGRUNDLAGEN,
DIE FÜR EINEN NACHTRAG ZUM DAB 6 UND FÜR DAS DAB 7
VORGESCHLAGEN WURDEN

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Ludwig-Maximilians-Universität

zu München



vorgelegt

von

Hans Weigand

aus

Vaihingen/Enz

Dezember 1958

Berichterstatter: 1. Prof. Dr. R. Springer

2. Prof. Dr. E. Bamann

Tag der mündlichen Prüfung: **28. JAN. 1959**

Meinen lieben Eltern

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK 10018

Die vorliegende Arbeit wurde am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität München in der Zeit von Oktober 1956 bis Oktober 1958 durchgeführt.

Die Anregung zu dieser Arbeit erhielt ich von

Herrn Professor Dr. Rudolf Springer

der auch die praktische Durchführung der Untersuchungen leitete. Für die stete Anteilnahme und wertvolle Förderung, sowie für seinen Rat bei allen auftretenden Schwierigkeiten und Fragen darf ich Herrn Professor Dr. Springer an dieser Stelle von Herzen Dank sagen.

Herrn Professor Dr. Eugen Bamann, Direktor des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität München, möchte ich für die stets fruchtbaren Anregungen und für die liebenswürdige Unterstützung meinen besonderen Dank aussprechen.

Herrn Professor Dr. Ludwig Hörhammer, Direktor des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre der Universität München, sei im besonderen gedankt für die Förderung, die ich während meines Studiums an der Universität München durch die Teilnahme an Exkursionen und durch Gespräche mit ihm selbst erfahren durfte.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900. The results are given in the following table.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900. The results are given in the following table.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900. The results are given in the following table.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1900. The results are given in the following table.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Einleitung	1
II. Ergebnisse der Untersuchungen	1
A. Verhalten von Salbengrundlagen gegenüber Aluminiumoxyd . .	1
1. Untersuchung der für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 vorgeschlagenen Salbengrundstoffe und -zubereitungen	2
a) Verhalten der Lösungen der ursprünglichen Substanzen beim Passieren einer Aluminiumoxydsäule	2
b) Verhalten der Verseifungsprodukte	4
2. Die Kapazität des Aluminiumoxyds gegenüber Salbengrund- stoffen	4
a) Kapazität unter optimalen Bedingungen	4
b) Sorptionskraft verschiedener Aluminiumoxyde	6
c) Einfluss des Lösungsmittels	6
B. Die Ultraviolettabsorption von Salbengrundstoffen	7
1. Ultraviolettabsorptionsspektren der Salbengrundlagen	7
2. Veränderung der Ultraviolettabsorptionsspektren von Hart- paraffinen durch selektive Sorption an Aluminiumoxyd . . .	10
C. Beitrag zur Analytik der Polyäthylenglykole	12
1. Polyäthylenglykolnachweise unter Berücksichtigung des Polymerisationsgrades	13
2. Betrachtung zur quantitativen Bestimmung von Polyäthylen- glykolen	15
D. Anordnung der Versuche	17
1. Ermittlung des Unverseifbaren	17
2. Bestimmung der Refraktion	17
3. Durchführung der sorptiven Filtration über Aluminiumoxyd .	17
4. Anordnung bei der Ermittlung der Ultraviolettabsorption . . .	19
5. Bestimmung der Jod- und Hydroxylzahl	19
6. Die für den qualitativen Nachweis von Polyäthylenglykolen verwendeten Reagenzien	19
7. Versuchsanordnung zum qualitativen Nachweis der Poly- äthylenglykole mittels Natriumperjodat	20
8. Versuchsbedingungen bei der Bindung von Quecksilber-II- chlorid an Polyäthylenglykol.	21
III. Zusammenfassung	21
IV. Literatur	
V. Übersichtstabellen	



I. Einleitung

Für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 sind Salben und Salbengrundlagen vorgeschlagen, die dem neuesten Stande der Wissenschaft entsprechen und der individuellen Hautbeschaffenheit weitgehend Rechnung tragen. Die von altersher bekannten Salbengrundstoffe und Salbenzubereitungen tierischen und pflanzlichen Ursprungs (23) sind in den Vorschlägen zum Deutschen Arzneibuch nicht mehr aufgeführt.

Während einige der vorgesehenen Stoffe und Stoffgemische unverändert oder zur Emulsion verarbeitet gebrauchsfertige Salben darstellen (Unguentum alcoholium lanae, Unguentum emulsificans, Glycerinum monostearinicum, Cetylstearylum emulsificans), sind Stoffe wie Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum, Alcholes lanae, Natrium cetylstearylosulfuricum und Oleum ricini polyoxaethylatum vorwiegend als Emulgatoren zu betrachten. Polyäthylenglycolum stearinicum sowie die Polyäthylenglykole verschiedenen Polymerisationsgrades (20, 86) bzw. Polyäthylenglykolegemische ergeben schon allein Salben mannigfacher Konsistenz, erlangen aber auch als Lösungs- und Hilfsmittel im Laboratorium immer grössere Bedeutung (81). Die Kohlenwasserstoffe, Oleylum oleinicum, Cetylstearylum sowie Oleum arachidis hydrogenatum spielen dagegen die Rolle „auffettender“ Bestandteile in Salbenzubereitungen.

Das Erkennen und mengenmässige Bestimmen dieser Stoffe bietet erhebliche Schwierigkeiten. Vorliegende Untersuchungen sollen einen Beitrag zur Kenntnis und Analytik der neuzeitlichen dermatologisch und kosmetisch angewandten Salbengrundstoffe und Salbenzubereitungen liefern.

II. Ergebnisse der Untersuchungen

A.) Verhalten von Salbengrundlagen gegenüber Aluminiumoxyd

Die Sorption von Salbengrundstoffen und Salbenzubereitungen aus Trichloräthylenlösungen an Aluminiumoxyd stellt ein ausgezeichnetes Hilfsmittel bei der Untersuchung dieser Gruppe von Arzneimitteln dar. Es erweist sich jedoch als notwendig, eine Reihe von Problemen zu lösen, um optimale Bedingungen für die Analytik auf diesem Gebiet zu schaffen.

Die Verwendbarkeit des Aluminiumoxyds ist neuerdings bei der Untersuchung von Carnaubawachs auf Paraffinkohlenwasserstoffe (5) erkannt worden. Auch andere Autoren verwenden auf anderen Teilgebieten der Analytik von

Fetten, Wachsen und ähnlichen Substanzen Adsorptionsmittel, zum Teil Aluminiumoxyde (9, 11, 25, 27, 37, 40, 41, 42, 44, 54, 55, 58, 62, 75, 82, 83), zum Teil dagegen die verschiedensten sonstigen Adsorbentien wie Kunstharz (16, 30, 31, 32, 33, 61), hydrophobierte Kieselgur (1, 15, 22, 30, 45) und ähnliche Stoffe (3, 4, 10, 26, 47, 60, 72, 73, 74, 76, 80)

1, Untersuchung der für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 vorgeschlagenen Salbengrundstoffe und Salbenzubereitungen

Im Vordergrund steht die Frage der Löslichkeit ^{†)} (Tabelle 1). Unter den untersuchten Lösungsmitteln erweist sich Trichloräthylen als besonders geeignet.

Im Zusammenhang mit einer Sorption an Aluminiumoxyd zeichnen sich nicht nur gute Trennmöglichkeiten durch eine selektive Sorption der Salbengrundlagen als solcher, sondern auch durch deren Verseifungsprodukte bzw. des Unverseifbaren ab (77, 78).

Tabelle 1 zeigt u. a. die errechneten und ermittelten Mengen an unverseifbaren Substanzen der vorgeschlagenen Salbengrundstoffe und Salbenzubereitungen.

Nach der üblichen Verseifung des anorganisch-organischen Esters Natrium cetylstearylösulfuricum mit 2-n-alkoholischer Kalilauge erfasst man stets nur einen geringen Anteil des gebundenen Fettalkohols. Erst nach saurer Spaltung resultiert ein Wert von 68,2 % für die freien und gebundenen Fettalkohole. (Nach dem Vorschlag für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 wird zur quantitativen Bestimmung von cetylstearylschwefelsaurem Natrium neben freien Fettalkoholen ebenfalls eine saure Spaltung durchgeführt).

a) Verhalten der Lösungen der ursprünglichen Substanzen beim Passieren einer Aluminiumoxydsäule

Unter den Versuchsbedingungen werden im ursprünglichen Zustand (unverseift) die fetten Öle, Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum, die Wachsalkohole und deren Estersalze, Oleylium oleinicum und die Polyäthylenglykole

^{†)} Die Nomenklatur berücksichtigt die Begriffsbestimmung der Pharmacopoea Internationalis. Ausnahmen mussten bei Cetylstearylium emulsificans und Unguentum emulsificans getroffen werden, da es sich hierbei um Gemische von Wachsalkoholen, die in den meisten Lipoidlösungsmitteln leicht löslich sind, und in diesen Lösungsmitteln praktisch unlöslichen Sulfaten dieser Alkohole handelt. Es wurde daher die Bezeichnung „teilweise löslich“ gewählt.



vollständig beim Passieren einer Aluminiumoxydsäule aus der Lösung in Trichloräthylen zurückgehalten (Tabelle 1). Die Kohlenwasserstoffe Vaselinum album, Vaselinum flavum, Paraffinum subliquidum und Paraffinum perliquidum laufen ungehindert hindurch.

Ausnahmen machen die Hartparaffine, wobei man zwischen Paraffinum durum und Paraffinum solidum zu unterscheiden hat. Bei Paraffinum durum 52/54 findet eine Sorption von 1.25 %, bei Paraffinum durum 60/62 eine solche von 0.13 %, bei Paraffinum solidum 52/54 eine Sorption von 0.98 % statt, während bei Paraffinum solidum 66/68 eine Sorption bis 8.57 % zu beobachten ist. Das Paraffinum durum stellt, wie O. SALZMANN (67) berichtet, eine farblose oder weisse mehr oder weniger durchscheinende Masse dar, die kristalline Struktur zeigt, während das Paraffinum solidum des DAB 6 sich durch mikrokristalline Struktur auszeichnet und mehr oder weniger verzweigt ist. - Der Grund für die Sorption von Hartparaffinanteilen an Aluminiumoxyd wird später (B, 2) ermittelt und mitgeteilt.

Natrium cetylstearylosulfuricum ist lediglich in Alkohol unter Erwärmen löslich und könnte aus alkoholischer Lösung an Aluminiumoxyd zur Sorption gebracht werden. Da Cetylstearylum emulsificans und Unguentum emulsificans auf Grund ihres Gehaltes an Natrium cetylstearylosulfuricum, wie oben bereits erwähnt „teilweise löslich“ sind, liegen hier beim Durchlaufen der Aluminiumoxydsäule ein Filtrations- und ein Sorptionsvorgang vor.

Auf Grund der selektiven Sorption können hinsichtlich der Zusammensetzung der Unguentum emulsificans, die in anderen Ländern bereits eine grosse Rolle spielt und in Pharmakopoeen aufgenommen wurde, sowie der nicht weniger wichtigen Unguentum alcoholium lanæ wichtige Aussagen gemacht werden. Cetyl- und Stearylalkohol sowie deren Salze der sauren Schwefelsäureester, Sterine und Wollwachsalkohole werden quantitativ zurückgehalten, während die Vaseline- und Paraffinanteile im Filtrat ermittelt werden können. Bei Unguentum alcoholium lanæ erhöht sich der Anteil der an Aluminiumoxyd fixierten Stoffe je nach Art des angewandten Hartparaffins um einen entsprechenden Betrag. Ein extrem hoher Wert lag um 2.5 % höher als derjenige, der den Gehalten an Sterinen und Wollwachsalkoholen entsprechen würde (Tabelle 1).

Neben der Unguentum emulsificans und der Unguentum alcoholium lanæ sind als wasserhaltige Emulsionssalben Unguentum emulsificans aquosum und Unguentum aquosum für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 vorgeschlagen worden. Vor ihrer Untersuchung ist die Herstellung einer Trichloräthylenlösung des lipidlöslichen Anteils erforderlich. Hierbei kann gleichzeitig eine quantitative Bestimmung des Wasseranteils erfolgen.



b) Verhalten der Verseifungsprodukte

Die Verseifungsprodukte verhalten sich gegenüber Aluminiumoxyd anders als die ursprünglichen Substanzen. Abgesehen von den Kohlenwasserstoffen erfahren alle übrigen Bestandteile des Unverseifbaren eine Adsorption, so dass dadurch eine Trennung ermöglicht wird. Im Filtrat der gelösten unverseifbaren Stoffe kann nach Entfernung des Lösungsmittels der Kohlenwasserstoffanteil gewichtsanalytisch ermittelt werden. Über die Möglichkeit der Aufarbeitung des Adsorbates (Wachsalkohole, Sterine) ist bereits von R. SPRINGER u. R. HERZINGER (78) berichtet worden.

2. Die Kapazität von Aluminiumoxyd gegenüber Salbengrundstoffen

a) Kapazität unter optimalen Bedingungen

Die bisherigen Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass man mit Hilfe des Adsorptionsmittels Aluminiumoxyd gute Trennungsmöglichkeiten bei der Analytik pharmazeutischer und kosmetischer Salbenzubereitungen erzielen kann. Die Bedingungen waren bei den Versuchen so gewählt, dass die Sorptionskraft des Aluminiumoxyds berücksichtigt wurde.

Die Kenntnis der Kapazität von Aluminiumoxyd ist für seine Verwendbarkeit als analytisches Hilfsmittel erstes Erfordernis. Folgende Substanzanteile werden von 15 g Aluminiumoxyd (unter den Versuchsbedingungen) festgehalten und können auch unter Anwendung grosser Mengen Trichloräthylens nicht eluiert werden:

I. Polyaethylenglycolum 200	0.522 g
II. Polyaethylenglycolum 300	0.685 g
III. Polyaethylenglycolum 400	0.620 g
IV. Polyaethylenglycolum 600	0.816 g
V. Polyaethylenglycolum 1000	0.905 g
VI. Unguentum Polyaethylenglycoli (ipse paratum)	0.865 g
VII. Polyaethylenglycolum 1500	0.985 g
VIII. Polyaethylenglycolum 2000	0.875 g
IX. Polyaethylenglycolum 3000	0.105 g
X. Polyaethylenglycolum 4000	0.055 g
XI. Polyaethylenglycolum 6000	0.040 g
XII. Unguentum Polyaethylenglycoli (Industriepräp.)	0.600 g
XIII. Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum	0.850 g
XIV. Oleum ricini polyoxaethylatum	0.465 g
XV. Polyaethylenglycolum stearinicum	0.650 g
XVI. Oleum arachidis hydrogenatum	0.540 g



XVII. Oleylium oleinicum	0.255 g
XVIII. Alcoholes lanae	0.640 g
XIX. Cetylstearylum	0.950 g
XX. Glycerinum monostearinicum	etwa ^{x)} 0.700 g

Überschreitet man die genannten Mengen, so findet sich im Eluat die entsprechende Salbengrundmasse in Anteilen, die bei den einzelnen Stoffen, graphisch dargestellt, einen unterschiedlichen, aber für jeden Stoff charakteristischen Kurvenverlauf ergeben (Abb. 1 bis 3).

Würde man beispielsweise unter den Versuchsbedingungen von 0.8 g Oleylium oleinicum oder Oleum ricini polyoxaethylatum ausgehen, die bei Einwaagen von 0.25 g bzw. 0.460 g eine 100 proz. Adsorption erfahren, so ergäben sich für Oleylium oleinicum nur eine 42 proz. und für Oleum ricini polyoxaethylatum eine 87 proz. Adsorption.

Bei der Adsorption der Polyaethylenglykole besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen Polymerisationsgrad und zurückgehaltenen Anteilen. Die Adsorption der Polyaethylenglykole bis zum Molekulargewicht 1500 steigt mit der Zunahme des Polymerisationsgrades; von da an ist bis zum Molekulargewicht 6000 eine ausserordentlich starke Abnahme zu verzeichnen. Von Polyaethylenglykol 6000 wird nur etwa 4 % des Anteils zurückgehalten, der bei Polyaethylenglykol 1500 in der Aluminiumoxydsäure verbleibt. Der relativ hohe Wert der Adsorption von Polyaethylenglykol 1500, der noch nicht gedeutet werden kann, wurde durch das gleiche Verhalten von Polyglykol 1500 (Anorgana Gendorf) und Polywachs (1500) (Hüls) bestätigt.

Natrium cetylstearylosulfuricum ist in den hier in Frage kommenden Lösungsmitteln praktisch unlöslich und fällt daher für die Adsorption an Aluminiumoxyd aus (II, A, 1, a).

Die Befunde hinsichtlich der Sorption von Salbengrundstoffen stehen in einem gewissen Widerspruch zu den Versuchsergebnissen von N. KREUTZKAMP u. Mitarbeitern (48). Bei ihren Adsorptionsversuchen mit Adeps suillus dürfte nach den vorliegenden Ergebnissen die Kapazität des Aluminiumoxyds (auf Grund eigener Befunde etwa 0.45 g auf 15 g Aluminiumoxyd) weit überschritten sein. Kreutzkamp arbeitete bei grösseren Einwaagen an Untersuchungsmaterial mit weniger

x) Unter den Versuchsbedingungen lösen sich nur etwa 0.7 g Glycerinum monostearinicum. Bei Verwendung grösserer Lösungsmittelmengen wird noch 1.0 g quantitativ zurückgehalten.




Abb. 1

Sorption von Polyäthylenglykolen an Aluminiumoxyd
(Aluminiumoxyd „basisch“, Lösungsmittel: Trichloräthylen)

- I = Polyäthylenglycolum 200
- II = Polyäthylenglycolum 300
- III = Polyäthylenglycolum 400
- IV = Polyäthylenglycolum 600
- V = Polyäthylenglycolum 1000
- VI = Unguentum Polyäthylenglycoli
(ipse paratum)






Abb. 2

Sorption von Polyäthylenglykolen an Aluminiumoxyd
 (Aluminiumoxyd „basisch“, Lösungsmittel: Trichloräthylen)

VII = Polyäthylenglycolum 1500

VIII = Polyäthylenglycolum 2000

IX = Polyäthylenglycolum 3000

X = Polyäthylenglycolum 4000

XI = Polyäthylenglycolum 6000

XII = Unguentum Polyäthylenglycoli
 (Industriepräparat)






Abb. 3

Sorption von fettähnlichen Stoffen, Fettsäurederivaten und
Alkoholen an Aluminiumoxyd
 (Aluminiumoxyd „basisch“, Lösungsmittel: Trichloraethylen)

- XIII = Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum
- XIV = Oleum ricini polyoxaethylatum
- XV = Polyäthylenglycolum stearinicum
- XVI = Oleum arachidis hydrogenatum
- XVII = Oleylium oleinicum
- XVIII = Alcoholes lanae
- XIX = Cetylstearylium



Aluminiumoxyd als hier in Ansatz gebracht wurde. Die Beobachtung, dass durch Eluieren mit mehreren Portionen Lösungsmittel 100 % des vorgelegten wasserfreien Eucerus im Fluor wiedergefunden wird, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden.

Systematische Untersuchungen erstrecken sich auch auf das Studium des Einflusses verschiedener Aluminiumoxyde und unterschiedlicher Lösungsmittel.

b) Sorptionskraft verschiedener Aluminiumoxyde

Die Sorptionskraft der verschiedenen Aluminiumoxyde weist keine beträchtlichen Unterschiede auf. Bei der Untersuchung des weitgehend einheitlichen und definierten Stoffes Ölsäureoleylester (für den Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 als Oleylium oleicum vorgeschlagen - Handelsname Cetiol -) wurde, wie der Kurvenverlauf der Sorption zeigt, kein grundsätzlicher Unterschied beobachtet (Abb. 4).

Die Anteile der an Aluminiumoxyd zur Sorption gebrachten Substanzen des wasserfreien Eucerus betragen 6,47 % (Aluminiumoxyd „basisch“), 7,84 % (Aluminiumoxyd „sauer“) und 8,03 % (Aluminiumoxyd „neutral“). In diesem Falle handelt es sich um eine selektive Sorption von Wollwachsalkoholen und Sterinen. Im Hinblick auf die guten Trenneffekte mit Aluminiumoxyd basisch, über die bereits berichtet wurde, wurde diesem der Vorzug gegeben.

c) Einfluss des Lösungsmittels

Der Einfluss des Lösungsmittels ist erheblich. Trichloräthylen und Benzol weisen die günstigsten Eigenschaften unter den untersuchten Lösungsmitteln auf, d. h. aus Lösungen, die mit ihrer Hilfe hergestellt sind, werden die hier interessierenden Salbengrundstoffe gut adsorbiert, bzw. die nicht zur Sorption gelangenden aus Gemischen gut getrennt.

Bei der schon erwähnten selektiven Sorption von Wachsen und Sterinen aus wasserfreier Wollwachsalkoholsalbe (ipse paratum) liegen bei Verwendung von Trichloräthylen (6,52 %) und Benzol (6,83 %) die Anteile der an Aluminiumoxyd festgehaltenen Stoffe viel näher am Idealwert ^{x)} (6,46 %) als z. B. bei der Verwendung von Chloroform (7,6 %) und Petroläther (9 %). Trichloräthylen wurde wegen seines besonders guten Lösungsvermögens und der mit seiner Anwendung verbundenen Ausschaltung der Feuersgefahr bevorzugt.

^{x)} Das Adsorbat besteht aus 6 % des Gemisches von Wollwachsalkoholen und Sterinen sowie aus 0,46 % Anteilen aus dem verwendeten Hartparaffin.




Abb. 4

Sorption von Oleylium oleinicum an verschiedene Aluminiumoxyde
 (Lösungsmittel : Trichloraethylen)

b = Aluminiumoxyd „basisch“

n = Aluminiumoxyd „neutral“

s = Aluminiumoxyd „sauer“



Aus den vorliegenden Erkenntnissen ergibt sich, dass Aluminiumoxyd ein sehr gutes analytisches Hilfsmittel bei der Analyse von Salbengrundstoffen und Salbenzubereitungen darstellt, dass jedoch die Einwaage von Untersuchungsmaterial so abgestimmt werden muss, dass auch diejenigen Stoffe, denen gegenüber das Aluminiumoxyd eine geringere Sorptionskraft besitzt, mit Sicherheit in der Adsorptionssäule verbleiben. Unter den Versuchsbedingungen sind das, abgesehen von den hochpolymeren Polyäthylenglykolen (3000, 4000 und 6000), bei Einwaagen von 0.5 g die übrigen angeführten Salbengrundstoffe.

B.) Die Ultraviolettabsorption von Salbengrundstoffen

1. Ultraviolettabsorptionsspektren der Salbengrundlagen

Ein bisher für die Analytik von Salben und Salbengrundlagen, vornehmlich solcher, die für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 vorgeschlagen wurden, kaum beachtetes Verfahren ist die Ultraviolett-spektrometrie. Die Versuchsergebnisse lehren, dass Lösungen der meisten hier in Frage stehenden Stoffe charakteristische Absorptionsmaxima und -minima aufweisen. Daher kann man dieses optische Untersuchungsverfahren in den Dienst der Analytik von Salbengrundlagen und -zubereitungen stellen.

Nicht alle vorgeschlagenen Grundstoffe und Salbenzubereitungen eignen sich für die Untersuchung mittels der Ultraviolett-spektrometrie unter den gewählten Versuchsbedingungen. Die Löslichkeiten von Glycerinmonostearat und der Fettalkoholsulfate (cetylstearylschwefelsaures Natrium - Lanette E) sind in den in Frage kommenden Lösungsmitteln sehr schlecht bzw. die Stoffe, die keine einheitliche Zusammensetzung aufweisen, lösen sich nur teilweise. Demzufolge kann auch die Unguentum emulsificans und Cetylstearylum emulsificans (Lanette N), die mit Hilfe von Lanette E bereitet sind, nicht auf diese Art untersucht werden.

Die Unterschiede in der Ultraviolettabsorption sind bei den einzelnen Salbengrundstoffen so verschieden, dass die Messbereiche in Konzentrationen liegen, die sich bis zu drei Zehnerpotenzen voneinander unterscheiden. Schon diese Tatsache ermöglicht es, Rückschlüsse auf die Anwesenheit eines Stoffes zu ziehen oder die Anwesenheit eines anderen auszuschliessen.

So kann beispielsweise auf das Vorhandensein von Polyäthylenglykolen oder Paraffinum perliquidum und Paraffinum subliquidum geschlossen werden, wenn die Extinktion in einer Grössenordnung von 10^{-3} bis 10^{-2} liegt. Andererseits weisen Unguentum alcoholium lanae, Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum,

Oleum ricini polyoxaethylatum, Vaselinum album und Vaselinum flavum sowie Alchoholes lanae Extinktionen auf, die im Bereich von 10^1 ermittelt wurden.

Eine Identifizierungsmöglichkeit von Salbengrundlagen ist durch die typischen Maxima und Minima gegeben. Ausserdem besteht die Möglichkeit, beispielsweise nach dem von R. SPRINGER u. R. HERZINGER (78) u. R. SPRINGER (77) vorgeschlagenen Gang der chemischen Analyse, die Salbengrundstoffe aus Zubereitungen abzutrennen und dann der Ultraviolett-spektrometrie zuzuführen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass inkorporierte Arzneistoffe, über deren Eliminierung R. SPRINGER u. R. HERZINGER (78) berichtet haben, die Ultraviolett-absorption stark beeinflussen können. Andererseits ist bei einer optischen Ermittlung von Arzneistoffen in Salbenzubereitungen zu berücksichtigen, dass die Ultraviolettabsorption der Salbengrundstoffe nicht ausser Acht gelassen wird. Es ist also nicht zutreffend, dass sich, wie M. BIRCHER (7) berichtet, oft eine zeitraubende Isolierung der Wirkstoffe umgehen lässt, da viele Trägerstoffe, die zur Herstellung von Salben und Suppositorien dienen, bei Wellenlängen über $220 \text{ m}\mu$ kein Licht absorbieren.

Im einzelnen zeigt sich der in Abb. 5 bis 9 dargestellte Kurvenverlauf der Absorptionen von Lösungen in Chloroform:

Kohlenwasserstoffe: (Abb. 5) In guter Übereinstimmung zeigen flüssige Paraffine und Hartparaffine ein charakteristisches Maximum bei $240 \text{ m}\mu$. Ein zweites befindet sich bei $271 \text{ m}\mu$, $264 \text{ m}\mu$ bzw. $259 \text{ m}\mu$. Minima liegen zwischen $252,5 \text{ m}\mu$ und $262,5 \text{ m}\mu$. Weissöle wurden von R. SCHNURMANN (68) sowie K. A. FISCHER u. Mitarbeitern (24) auf ihre Ultraviolettabsorption im Zusammenhang mit dem Aromatengehalt untersucht. Das erstgenannte Maximum wird von den genannten Autoren nicht beschrieben. Bei der Untersuchung einer grösseren Anzahl von Paraffinen und Vaselinen beobachtet man jeweils Unterschiede bezüglich der Extinktion, so dass die hier mitgeteilten Werte als Durchschnittswerte anzusehen sind. Die Extinktionen der Vaselinen liegen bedeutend über denen der Hartparaffine und diese wieder über denen flüssiger Paraffine. Grundsätzlich unterscheidet sich jedoch der Verlauf der Kurven nicht.

Polyaethylenglykole: (Abb. 6 und 7) Die Extinktionen der Polyaethylenglykole bewegen sich in der Grössenordnung von 10^{-3} und 10^{-2} . Abgesehen von Polyaethylenglykol 1500 scheint ein Zusammenhang zwischen Polymerisationsgrad sowie Höhe und Lage des Maximums zu bestehen. Die geringfügige Abweichung von Polyaethylenglykol 400 dürfte darauf zurückzuführen sein, dass das zur Verfügung stehende Produkt (Anorgana Gendorf) eine leichte Eigenfärbung aufweist. Polyaethylenglykol 1500, das sich durch einen flachen Verlauf der Ultraviolettabsorptionskurve auszeichnet, wies auch bei der Adsorption an Aluminiumoxyd ein auffallendes Verhalten auf (II, A, 2, a). Dieser vorerst noch nicht deutbare op-



tische Befund wird jedoch durch das gleiche Verhalten von Polyglykol 1500 (Anorgana Gendorf) und Polywachs 1500 (Hüls) bestätigt. Von flüssigen Paraffinen, die eine ähnlich hohe Extinktion aufweisen, unterscheiden sich die Polyäthylenglykole durch das Fehlen eines zweiten Maximums.

Weitere Salbengrundlagen: (Abb. 8) Die hier beschriebenen Stoffe unterscheiden sich bereits durch ihre mehr oder weniger stark ausgeprägte Eigenfärbung, die sich auch bei der Absorption im ultravioletten Licht bemerkbar macht. Die charakteristischen Kurvenverläufe der ungefärbten Stoffe Cetylstearylum, Oleum arachidis hydrogenatum und Polyaethylenglycolum stearinicum liegen in einem Extinktionsbereich von 10^{-1} , die der gefärbten Substanzen Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum, Oleylium oleinicum, Alcoholes lanae und Oleum ricini polyoxaethylatum in einem Extinktionsbereich von 10^0 und 10^1 . Abgesehen von Oleum ricini polyoxaethylatum, das bei 272,5 m μ ein zweites Maximum aufweist, ist jeweils nur eines vorhanden, das vielfach, wie z. B. bei Oleum arachidis hydrogenatum, Polyaethylenglycolum stearinicum und Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum, besonders stark ausgeprägt ist.

Zubereitungen: (Abb. 9) Der Kurvenverlauf der UltraviolettabSORPTION von Unguentum Polyaethylenglycoli - eine Mischung gleicher Teile Polyaethylenglykol 300 und Polyaethylenglykol 1500 - ähnelt dem des Polyaethylenglykol 300. Das abweichende Verhalten von Polyaethylenglykol 1500 mit seiner flachen Kurve tritt in den Hintergrund. Auch bei Mischungen des Polyaethylenglykol 1500 mit anderen Polyaethylenglykolen niedrigeren Polymerisationsgrades konnte ein gleiches Verhalten beobachtet werden, d. h. das Ultraviolettspektrum ist mehr durch die niedermolekularen Verbindungen charakterisiert als durch das Polyaethylenglykol 1500. Die Art, wie sehr ein niedermolekulares Polyaethylenglykol das Ultraviolettspektrum beeinflussen kann, geht auch aus dem Befund hervor, dass das Minimum des Polyaethylenglykol 200 bei 237 m μ sich bei einer Unguentum Polyaethylenglycoli, die aus gleichen Teilen Polyaethylenglykol 200 und Polyaethylenglykol 1500 bereitet ist, durch eine Abflachung der Kurve bei 235 m μ bemerkbar macht. Die Unguentum alcoholium lanae weist ein Ultraviolettspektrum auf, das als Resultante der Spektren seiner Bestandteile Paraffinum durum, Vaselinum flavum, Paraffinum subliquidum und Alcoholes lanae hinsichtlich der Höhe betrachtet werden kann. Charakteristisch ist ein Maximum bei 241 m μ . Jeder der Bestandteile weist im Bereich von 240 m μ bis 244 m μ ein Maximum auf, das bei der Unguentum alcoholium lanae besonders stark ausgeprägt ist. Im Bereich von 250 m μ bis 290 m μ ist der Einfluss der Wachsalkohole erkennbar. Das Ultraviolettspektrum einer neben dem Industrieprodukt Encerinum anhydricum (Beiersdorf) selbst bereiteten Unguentum alcoholium lanae zeigt eine gute Übereinstimmung.




Abb. 5

Ultravioletabsorption von Kohlenwasserstoffen, gelöst in Chloroform

I = Paraffinum perliquidum	Max. 271 m μ und 240 m μ Min. 252.5 m μ
II = Paraffinum subliquidum	Max. 271 m μ und 241 m μ Min. 257 m μ
III = Paraffinum durum 52/54	Max. 264 m μ und 240 m μ Min. 255 m μ
IV = Paraffinum durum 60/62	Max. 259 m μ und 240 m μ Min. 253 m μ
V = Vaselinum album	Max. 262.5 m μ und 232 m μ Min. 255 m μ
VI = Vaselinum flavum	Max. 264 m μ und 241 m μ Min. 254 m μ






Abb. 6

Ultraviolettabsorption von Polyäthylenglykolen, gelöst in Chloroform

I = Polyaethylenglykol	200	Max.	254	mμ
			Min.	237 mμ
II = Polyaethylenglykol	300	Max.	249	mμ
III = Polyaethylenglykol	400	Max.	244	mμ
IV = Polyaethylenglykol	600	Max.	247	mμ
V = Polyaethylenglykol	1000	Max.	245	mμ




Abb. 7

Ultraviolettabsorption von Polyäthylenglykolen, gelöst in Chloroform

- I = Polyäthylenglykol 1500 Max. 265 mμ - 267.5 mμ
- II = Polyäthylenglykol 2000 Max. 245 mμ
- III = Polyäthylenglykol 3000 Max. 243 mμ
- IV = Polyäthylenglykol 4000 Max. 244 mμ
- V = Polyäthylenglykol 6000 Max. 246 mμ




Abb. 8

Ultraviolettabsorption weiterer Salbengrundlagen, gelöst in Chloroform

- | | |
|--|---|
| I = Oleum arachidis hydrogenatum | Max. 241 mμ |
| II = Oleylium oleinicum | Max. 236 mμ |
| III = Sorbitanum monooleinicum
polyoxaethylatum | Max. 242,5 mμ |
| IV = Polyaethylenglycolum
stearinicum | Max. 242,5 mμ |
| V = Cetylstearylum | Max. 235 mμ |
| VI = Alcoholes lanae | Max. 244 mμ |
| VII = Oleum ricini polyoxaethylatum | Max. 272,5 mμ und 233/234 mμ
Min. 269 mμ |




Abb. 9

Ultraviolettabsorption von Salbenzubereitungen, gelöst in Chloroform

- | | |
|--|-----------------|
| I = Unguentum Polyäthylenglycoli (Lanogen 1500) | Max. 250 $m\mu$ |
| II = Unguentum Polyäthylenglycoli (ipse parat.) | Max. 246 $m\mu$ |
| III = Unguentum alcoholium lanae
(Eucerinum anhydricum) | Max. 241 $m\mu$ |
| IV = Unguentum alcoholium lanae (ipse parat.) | Max. 241 $m\mu$ |

2. Veränderung der Ultraviolettabsorptionsspektren von Hartparaffinen ^{xx)} durch selektive Sorption an Aluminiumoxyd

Der Kurvenverlauf der Ultraviolettabsorptionsspektren von Lösungen pharmazeutisch verwendeter Hartparaffine in Chloroform weist vor und nach Durchlaufen einer Aluminiumoxydsäule Unterschiede auf. Aluminiumoxyd hält von den hier untersuchten Substanzen bis zu etwa 8 % zurück (II, A, 1, a). Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sorption und Extinktion. Je grösser die Sorption an Aluminiumoxyd, desto höher liegen die Extinktionen der nicht adsorbierten Anteile. - Als Ursache für die Erscheinung wird die Anwesenheit von ungesättigten Kohlenwasserstoffen und Oxydationsprodukten verantwortlich gemacht.

Tabelle 2

Zusammenstellung der untersuchten Paraffine

	Schmelzbereich ^{x)} °C	Sorption an Aluminiumoxyd aus		Jodzahl	Hydroxylzahl
		Chloroformlösungen %	Trichloräthyl- lösungen %		
Paraffinum durum	52/54	1.71	1.25	0.25	-
Paraffinum solidum	52/54	0.26	0.98	0.57	-
Paraffinum durum	60/62	0.68	0.13	0.19	-
Paraffinum solidum	66/68	7.63	8.57	2.7	21.1

^{xx)} Im Vorschlag für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 werden Schmelzintervalle angegeben, nicht Schmelzpunkte.

^{x)} Für den Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 ist Paraffinum durum vorgeschlagen. Paraffinum solidum, das sich von Paraffinum durum durch die Kristallform unterscheidet, ist im DAB 6 aufgeführt. Paraffinum durum zeigt kristalline Struktur, Paraffinum solidum dagegen mikrokristalline.

Während bei den sonstigen Adsorptionsversuchen Trichloräthylen als Lösungsmittel Anwendung fand, wurde im vorliegenden Falle Chloroform für die Ultraviolett-spektrometrie „Merck“ bevorzugt, um das Eigenspektrum des Lösungsmittels auszuschalten. Die Menge der zurückgehaltenen Anteile unterscheiden sich bei Anwendung der beiden Lösungsmittel geringfügig (Tabelle 2).

Die Verschiebung der Maxima und Minima tritt nicht stark in Erscheinung. Grundsätzlich zeigen die Kurven einen nahezu parallelen Verlauf. Lediglich bei Paraffinum durum 60/62 findet die Verlagerung eines der beiden Maxima von 259 m μ auf 257,5 m μ statt (Abb. 12).

Durch die Filtration über Aluminiumoxyd findet offensichtlich eine Reinigung der Paraffine statt, die sich im Ultraviolett-spektrum bemerkbar macht. Dieser Vorgang ist mit der Raffination von Speisefetten mittels Bleicherden (Floriden, Tonsil, Kieselgel, Aktivkohle und Aluminiumoxyd) vergleichbar. Auch dort findet, wie H. P. KAUFMANN u. Mitarbeiter (46) feststellten, eine Erhöhung der Extinktion statt.

Als Begleitstoffe der Hartparaffine kennt man insbesondere deren Oxydationsprodukte, ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Paraffine mit konjugierten Doppelbindungen sowie polycyclische Aromaten. Nach Ansicht von S. H. NEWBURGER (59) kann der Anteil an ungesättigten Kohlenwasserstoffen und Oxydationsprodukten ungefähr 7 bis 8 % betragen. Zum Unterschied von n-Paraffinen neigen die genannten Verbindungen zu einer Adsorption an Aluminiumoxyd.

Einige dieser Stoffe werden im gefilterten ultravioletten Licht sichtbar. Für die mannigfachen Fluoreszenzerscheinungen der Paraffine, die nach W. PRESTING u. S. JÄNICKE (63) hellblau oder dunkelblau aber auch grün aufleuchten können, werden vorwiegend Paraffine mit konjugierten Doppelbindungen sowie polycyclische Aromaten verantwortlich gemacht.

Die untersuchten Hartparaffine und ihre Lösungen in Chloroform zeigen im ultravioletten Licht eine hellblaue Fluoreszenz. Lässt man die Chloroformlösungen über eine Aluminiumoxydsäule laufen, so wird eine etwa 1 mm starke fluoreszierende Schicht sichtbar, die sich beim Eluieren mit jeweils 10 ml Lösungsmittel um ungefähr 1,5 cm nach unten bewegt und schliesslich im Eluat erscheint.

Eine vergleichsweise untersuchte 0,01 proz. Lösung von Anthracen in Chloroform weist eine stärkere Fluoreszenz auf als die Lösung des Hartparaffins. Das Anthracen, dessen Verbleib in der Aluminiumoxydsäule leicht zu verfolgen ist, durchwandert diese unter den gleichen Bedingungen wie der fluoreszierende Bestandteil des Paraffins. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass das Adsorbat, das






Abb. 10

Ultravioletabsorptionsspektren von Paraffinum durum 52/54,
gelöst in Chloroform.

I Im ursprünglichen Zustand	Max. 264 m μ und 240 m μ Min. 255 m μ
II Nach Durchlaufen einer Aluminium- oxydsäule	Max. 264 m μ und 240 m μ Min. 255 m μ




Abb. 11

Ultraviolettabsorptionsspektren von Paraffinum solidum 52/54,
gelöst in Chloroform.

I Im ursprünglichen Zustand

Max. 264 mμ und 240 mμ

Min. 255 mμ

II Nach Durchlaufen einer Aluminium-
oxydsäule

Max. 264 mμ und 240 mμ

Min. 255 mμ




Abb. 12

Ultravioletabsorptionsspektren von Paraffinum durum 60/62,
gelöst in Chloroform.

I Im ursprünglichen Zustand

Max. 259 mμ und 240 mμ

Min. 253 mμ

II Nach Durchlaufen einer Aluminium-
oxydsäule

Max. 257.5 mμ und 240 mμ

Min. 253 mμ




Abb. 13

Ultraviolettabsorptionsspektren von Paraffinum solidum 66/68,
gelöst in Chloroform.

I Im ursprünglichen Zustand	Max. 264 mμ und 240 mμ Min. 262.5 mμ
II Nach Durchlaufen einer Aluminium- oxydsäule	Max. 264 mμ und 240 mμ Min. 262.5 mμ

nicht mehr fluoresziert, ins Gewicht fallende Mengen von Cycloparaffinen enthält. Ergebnisse der qualitativen Reaktion auf die Anwesenheit von Isoparaffinen (2) können diese weitgehend ausschliessen.

Ein beträchtlicher Gehalt an ungesättigten Kohlenwasserstoffen würde sich durch eine entsprechende Jodzahl kenntlich machen. Bei den untersuchten Kohlenwasserstoffen differieren die Jodzahlen zwischen 0.2 und 2.7. Es liegt ein Zusammenhang zwischen Jodzahl, Sorption an Aluminiumoxyd und Verschiebung der Extinktion vor (Tabelle 2, Abb. 10-13). Die Verbindungen, die die Jodzahl bedingen, werden von Aluminiumoxyd zurückgehalten. Während beispielsweise das untersuchte Paraffinum solidum 66/68, das etwa 8 % an Aluminiumoxyd adsorbierbare Stoffe enthält, im ursprünglichen Zustand eine Jodzahl von 2.7 besitzt, ist diese, im Abdampfrückstand des Eluats ermittelt, praktisch null. Ähnlich wie bei der Jodzahl liegen die Verhältnisse bei der Hydroxylzahl, die hier einen Gehalt an hydroxylhaltigen Verbindungen in Form von Oxyfettsäuren und höhermolekularen Alkoholen anzeigt. Auch die Hydroxylzahl (OHZ) weist im ursprünglichen Paraffinum durum 66/68 (OHZ=21.1) und nach Durchlaufen einer Aluminiumoxydsäule (OHZ=1.7) eine ausserordentlich starke Veränderung auf.

Aus diesen Versuchsergebnissen wird geschlossen, dass im vorliegenden Falle vornehmlich ungesättigte Kohlenwasserstoffe und Oxydationsprodukte von Aluminiumoxyd zurückgehalten werden und dass diese Stoffe auch die Erniedrigung der Extinktion der festen Paraffine bedingen.

C.) Beitrag zur Analytik der Polyäthylenglykole

Die Polyäthylenglykole sind im Zusammenhang mit der Adsorption an Aluminiumoxyd und der Ultraviolett-spektrometrie von Salbengrundlagen Gegenstand der Untersuchungen gewesen. Hierbei konnte beobachtet werden, dass der Polymerisationsgrad (bzw. das Molekulargewicht) weitgehend für ihr Verhalten massgebend ist.

Es werden im folgenden qualitative und quantitative Reaktionen unter Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit auf Polyäthylenglykole verschiedenen Polymerisationsgrades einer Betrachtung unterzogen und neue Wege zur qualitativen und quantitativen Erfassung dieser Substanzen gewiesen.

1. Polyaethylenglykollnachweise unter Berücksichtigung des Polymerisationsgrades

Die Polyaethylenglykollnachweise sind bis zu einem gewissen Grade empirisch ermittelt worden. Erst B. WURZSCHMITT (87) hat in seiner „Systematik und qualitative Untersuchung capillaraktiver Substanzen“ grundlegende Erkenntnisse über die „nichtionogenen“ Polyaethylenglykole vermittelt. Er stellte dabei fest, dass diese Verbindungen in wässriger Lösung als kationcapillaraktive Oxoniumhydroxyde vorliegen und durch Säuren oder Salze unter Bildung eines Polyoxoniumions temär gemacht werden; dieses kann mit geeigneten Reagenzien nachgewiesen werden.

Vielfach versagen einige noch vor Jahren anwendbare qualitative Nachweisreaktionen, die offensichtlich auf Nebenprodukte, die bei der Herstellung angefallen waren, ansprachen, da die Produktion inzwischen ausserordentlich verfeinert wurde. So tritt die von A. WANKMÜLLER (84) beschriebene Reduktion einer 10 proz. Silbernitratlösung bei neuzeitlichen Produkten nicht mehr ein. Ferner verläuft der Nachweis mit Cadmiumjodid nach B. REICHERT (66) erst dann positiv, wenn durch Zusatz von z. B. Bariumchlorid die entsprechende Oniumverbindung hergestellt wird.

Nicht alle in der Literatur zitierten Nachweisreaktionen sind geeignet, Polyaethylenglykole schlechthin nachzuweisen. Die systematische Überprüfung ergab, dass auch hier eine Abhängigkeit von Polymerisationsgrad bzw. Molekulargewicht besteht. (Tabelle 3)

Der Unterschied der Reaktionsbereitschaft der niedermolekularen flüssigen Produkte und der höhermolekularen festen ist offensichtlich. Viele Reaktionen treten bei den festen Polyaethylenglykolen mit dem Molekulargewicht über 1000 rasch und deutlich ein, während bei den niedermolekularen häufig ein Überschuss an Reagenzlösung erforderlich ist und Farbreaktionen sowie Reaktionen, die sich durch Auftreten eines Niederschlags positiv zu erkennen geben, verzögert eintreten (Tabelle 4). Die Verbindungen Sorbitanum monooleinicum polyoxaethylatum und Oleum ricini polyoxaethylatum, bei denen Polyaethylenglykol ein Bestandteil ist, sprechen auf die meisten der erprobten Nachweisreaktionen an.

Bei der Austestung einer grossen Zahl von Reagenzien zum Zwecke der Auffindung von neuen Nachweisreaktionen, die den qualitativen Nachweis der Polyaethylenglykole gestatten und gleichzeitig einen Einblick in die Grösse des Molekulargewichts vermitteln, erwies sich zunächst die Anwendung von Phosphor-Wolfram-Molybdän-Säurelösung, mit der nach Folin und Denis Phenole nachgewiesen werden, als besonders günstig. Die Vorteile sind folgende:

Die Reaktion ist hinreichend spezifisch. Glycerin und Aethylenglykol werden nicht angezeigt. Der Farbton der Fällung ist bei den Polyaethylenglykolen sämtlicher untersuchter Molekulargewichte gleichbleibend gelb. Hinsichtlich des Polymerisationsgrades können Aussagen gemacht werden, da das Verhalten von Lösungen der verschiedenen Polyaethylenglykole signifikante Unterschiede zeigt (Tabelle 5). Es treten bei den einzelnen Polyaethylenglykolen nach Zugabe verschiedener Mengen des Reagenzes nacheinander folgende Erscheinungen auf:

1. Gelbfärbung des Reaktionsgemisches.
2. Entstehen eines Niederschlages, der beim Umschütteln verschwindet.
3. Verbleibende Trübung.
4. Zähflüssigwerden des Reaktionsgemisches.

Die Polyaethylenglykole mit dem Molekulargewicht 200 und 300 benötigen grössere Mengen Reagenzlösung bei 5 proz. Konzentration der Prüflösung. Der zunächst entstehende Niederschlag löst sich beim Umschütteln. Erst 5 ml einer 5 proz. Lösung und 3,5 ml Reagenz ergeben eine bleibende Trübung. Bei Erhöhung der Reagenzmenge treten die gleichen Erscheinungen auf, wie sie bei den anderen Polyaethylenglykolen beobachtet werden.

Des weiteren erweist sich eine 0,1 proz. Anthronlösung (9, 10-Dihydro-9-oxo-anthracen), die J. A. RADLEY (64) zum Nachweis von Glykolen angewandt hat, als geeignet zum Nachweis der Polyaethylenglykole (Tabelle 4).

Schliesslich wurde noch eine dritte neue Nachweismöglichkeit ausgearbeitet, die darauf beruht, dass sich das Depolymerisationsprodukt der Polyaethylenglykole in den einfach feststellbaren Formaldehyd überführen lässt. Der Nachweis des Monoaethylenglykols erfolgt in Anlehnung an die Methode von B. WARSHOWSKY u. P. J. ELVING (85), N. B. LAPKINA u. W. A. NASARENKO (50) sowie F. E. CRITCHFIELD und J. B. JOHNSON (14). Um Nebenreaktionen auszuschalten, wird nach Depolymerisation der Polyaethylenglykole und nach erfolgter Oxydation mittels Perjodsäure der gebildete Formaldehyd abdestilliert und im Destillat mittels Schiffs Reagenz nachgewiesen. Unter den beschriebenen Versuchsbedingungen stört das Jod, das aus der Perjodsäure frei wird, nicht.

Die Polyaethylenglykole unterschiedlichen Polymerisationsgrades unterscheiden sich durch die Geschwindigkeit, mit der die Depolymerisation verläuft. Nach einer Kochzeit von 15 Minuten mit 25 proz. Schwefelsäure ist auch bei den höhermolekularen Polyaethylenglykolen eine hinreichende Menge depolymerisiert, die einen zuverlässigen Nachweis ermöglicht.

Glycerin und Aethylenglykol, deren Anwesenheit jedoch z. B. mittels des obengenannten Reagenzes nach Folin und Denis ausgeschlossen werden kann, geben die Formaldehydreaktion ebenfalls.



Nachweis von Polyäthylenglykolen verschiedenen Polymerisationsgrades sowie von po

(Vorlage: 5 ml einer e

Reagenz- menge	Polyaethylenglykol					
	400	600	1000	1500	2000	3000
0.1 ml	← mit steigendem Molekulargewicht zunehmende gelbe, flockig					
0.25 ml	Niederschlag beim Umschütteln löslich			verbleibende schwache Trübung	←	
0.5 ml	Niederschlag beim Umschütteln löslich	← verbleibende starke Trübung				
0.75 ml	Niederschlag beim Umschütteln löslich	← verbleibende starke Trübung, Reaktion				
1.0 ml	Niederschlag beim Umschütteln löslich	← verbleibende starke Trübung, Reaktion				
1.5 ml	verbleibende Trübung	←	zähflüssig	→	←	Niederschlag
2.0 ml	verbleibende Trübung	←	zähflüssig	→	←	Niederschlag
3.0 ml	Niederschlag absetzend	←	gallertig	→	← Niederschlag	
5.0 ml	Niederschlag absetzend	gallertig	←			

lyerten Produkten mittels Phosphor-Wolfram-Molybdän-Reagent nach Folm und Denis
 tigen wässrigen Lösung)

4000	6000	Unguentum Polyaethylen- glycoli ipse parat.	Unguentum Polyaethylen- glycoli Lanogen 1500	Sorbitanum monooleini- cum polyox- aethylatum	Oleum ricini polyox- aethylatum
ung, die beim Umschütteln verschwindet				gelbe, flockige Fällung, die beim Umschütteln verschwindet	
verbleibende Trübung				gelbe, flockige Fällung, die beim Umschütteln verschwindet	
ung				verbleibende starke Trübung	verbleibende schwache Trübung
sch zähflüssig werdend				verbleibende starke Trübung, -zähflüssig	
sch zähflüssig werdend				zähflüssig	gallertig
bsetzend			zähflüssig		gallertig
bsetzend			zähflüssig		
nd			zähflüssig	Niederschlag absetzend	
Niederschlag absetzend					

2. Betrachtung zur quantitativen Bestimmung von Polyäthylenglykolen

Auf die Bedeutung des Polymerisationsgrades im Zusammenhang mit den Nachweisreaktionen der Polyäthylenglykole ist bereits verschiedentlich hingewiesen worden (C, 1). Besonders die hier erstmals durchgeführte Umsetzung mit Phosphor-Wolfram-Molybdänsäure lehrt, dass sich die Polyäthylenglykole mit einem zweiten Reaktionspartner nicht in allen Fällen in „äquivalenten Mengen“ umsetzen. Auch R. NEU (57) fand, dass bei der quantitativen Bestimmung von 1, ω -Dihydroxypolyäthylenoxyden mit Natriumtetraphenylborat bei gleichen Einwaagen an Untersuchungssubstanzen die Mengen des entstehenden Niederschlages bis etwa 30 % differieren. Diese Erkenntnis lässt die quantitativen Bestimmungen, wie sie bisher durchgeführt worden sind, von vornherein als ungeeignet dazu erscheinen, den Gehalt an Polyäthylenglykolen anzugeben, wenn Polymerisationsgrad bzw. Molekulargewicht nicht bekannt sind. Auf die Möglichkeit eines einfachen Verfahrens zur ungefähren Ermittlung des Molekulargewichts ist im vorigen Abschnitt (C, 1) hingewiesen.

Es erscheint ferner aussichtsreich, etwa in der Art wie bei dem in Abschnitt C, 1 ausgearbeiteten Nachweis, der auf der Ermittlung eines Abbauproduktes beruht, eine quantitative Bestimmung durchzuführen. Die Ergebnisse eigener Versuche, Polyäthylenglykole quantitativ in Formaldehyd überzuführen, waren jedoch nicht so erfolgreich, dass sie die Grundlage für eine quantitative Bestimmung darstellen können.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist die Umsetzung von Polyäthylenglykolen mit ionogenen Reaktionspartnern so interessant, dass sie einer näheren Betrachtung unterzogen werden soll.

Im vorigen Abschnitt wurde u. a. dargelegt, dass die Polyäthylenglykole mit Quecksilber-II-chloridlösung einen weissen Niederschlag ergeben. Hierbei benötigen die niedermolekularen flüssigen Polyäthylenglykole unter den Versuchsbedingungen mehr Reagenz als die hochmolekularen festen.

Bei der quantitativen Ausgestaltung dieses Nachweises ergibt sich folgendes Bild:

Unter Anwendung von 0.1 g Polyäthylenglykol werden bei Zusatz überschüssiger 0.1-m-Sublimatlösung zur Bildung des Niederschlags Quecksilber-II-chloridmengen benötigt, die zwischen 0.16 g und 0.87 g variieren. Die graphische Darstellung lehrt, dass die Menge des gebundenen Quecksilber-II-chlorids einer gewissen Gesetzmässigkeit folgt (Abb. 14 und 15).




Abb. 14

Fähigkeit der Bindung von Quecksilber-II-chlorid an 0.1 g
Polyaethylenglykol der Molekulargewichte 600 bis 1500.





Abb. 15

Fähigkeit der Bindung von Quecksilber-II-chlorid an 0.1 g
Polyaethylenglykol der Molekulargewichte 1500 bis 6000.

Mit Hilfe der Sublimatfällung kann der Polymerisationsgrad eines vorliegenden Polyäthylenglykols bzw. eines im Verlaufe einer Analyse isolierten Polyäthylenglykols bestimmt werden, da unter den Versuchsbedingungen von 0.1 g Polyäthylenglykol eine ganz bestimmte Menge Sublimat angelagert wird.

Die Vorstellung über den Vorgang der Bildung eines Polyoxoniumsalzes nach B. WURZSCHMITT (87) zeigen folgende Formeln:



Nach B. WURZSCHMITT (87) beträgt der Oxonierungsgrad (die mit x_1 bezeichnete Glykoleinheit) etwa 37 %. Die eigenen Untersuchungsbefunde lehren, dass die niedermolekularen Polyäthylenglykole entweder einen wesentlich höheren Oxonierungsgrad haben müssen als die niedermolekularen, da sie weit mehr Quecksilber-II-chlorid anlagern, als dem Oxonierungsgrad entsprechen würde, oder dass sie zu sonstigen Bindungsformen befähigt sind.

Man kann den Einschluss grösserer Mengen Quecksilber-II-chlorids ausschliessen. Der Niederschlag ist leicht filtrierbar und kann gut nachgewaschen werden. Mutmasslich neigen die niedermolekularen Polyäthylenglykole dazu, neben der von B. WURZSCHMITT angegebenen Bindungsform auf andere bisher nicht geklärte Weise Salze zu binden.

Hinsichtlich der nach B. WURZSCHMITT errechneten und der ermittelten Menge gebundener Anteile ergibt sich folgendes Bild für die Polyäthylenglykole vom Molekulargewicht 600 bis 6000 (Tabelle 6).

Unterschiede zwischen errechnetem Sublimat und tatsächlich gebundenem beruhen zum Teil darauf, dass die Handelsprodukte nicht genau auf ein Molekulargewicht von z. B. 6000 eingestellt sind, das der Berechnung zugrunde gelegt wurde.


Unter Zugrundelegen, dass sowohl Hg, als auch HgCl oder HgCl₂ an Polyäthylenglykol gebunden werden könnten, besteht keine Übereinstimmung zwischen errechneten und ermittelten Werten.

Tabelle 6

Zusammenhang zwischen Molekulargewicht, Oxonierungsgrad und Bindungsvermögen von Quecksilber-II-chlorid der Polyäthylenglykole.

Molekulargewicht	Zahl der (CH ₂ ·O·CH ₂) Gruppen	Anzahl der oxonierten Gruppen (Oxonierungs- grad 37% nach B. Wurzschmitt)	an 0,1 g Polyäthylenglykol gebundenen Anteile				
			berechnet			gefunden	
			(Oxonierungsgrad 37% - nach B. Wurzschmitt)				
			Hg g	HgCl g	HgCl ₂ g	g	
600	12.2	4.5	0.151	0.178	0.204	0.873	
1000	21.3	7.9	0.158	0.186	0.214	0.427	
1500	32.7	12.1	0.161	0.190	0.218	0.183	
2000	44.0	16.3	0.163	0.192	0.221	0.175	
3000	66.8	24.7	0.165	0.194	0.224	0.170	
4000	89.5	33.1	0.166	0.195	0.225	0.164	
6000	134.9	49.9	0.167	0.196	0.226	0.160	

Am wahrscheinlichsten weist die beim Nachweis von Polyäthylenglykolen mit Quecksilber-II-chlorid entstandene Verbindung folgenden Aufbau auf:



Bei den Polyäthylenglykolen vom Molekulargewicht 3000 ab aufwärts würde sich dann unter der Voraussetzung, dass keine anderen Bindungen eintreten, ein Oxonierungsgrad von 29,7 % errechnen. Infolgedessen ist, zumindest für Sublimat als Fällungsmittel, der Oxonierungsgrad von 37 %, wie ihn B. WURZSCHMITT angibt, als nicht verbindlich zu betrachten.

Diese Befunde bekräftigen erneut die Ansicht, dass eine exakte quantitative Bestimmung von Polyäthylenglykolen mit einer Bestimmung des Molekulargewichts Hand in Hand gehen muss. Quecksilber-II-chlorid ist als quantitatives Nachweisreagenz lediglich für die höhermolekularen Polyäthylenglykole geeignet.

D.) Anordnung der Versuche

1. Ermittlung des Unverseifbaren

Die Ermittlung des unverseifbaren Anteils erfolgt nach der Vorschrift der Deutschen Einheitsmethoden (17).


2. Bestimmung der Refraktion

Die Refraktion wurde mittels eines Zeiss-Opton-Abbe-Refraktometers in Verbindung mit einem Höppler-Thermostaten bei 40° C ermittelt. Die mitgeteilten Zahlen sind Durchschnittswerte mehrerer Ablesungen.

3. Durchführung der sorptiven Filtration über Aluminiumoxyd

Glasröhrchen von 12 cm Länge und 1,4 cm lichter Weite werden mit 15 g (entsprechend etwa 8 cm Höhe) Aluminiumoxyd (WOELM, basisch, Akt. -Stufe I) gefüllt. Die Röhrchen sind mit einem Glashahn versehen, der es gestattet, die Abtropfgeschwindigkeit zu regulieren. Die Lösung der Untersuchungssubstanz (es gelangten Einwaagen von 0,04 g bis 2 g zur Anwendung) erfolgt in 10 ml

Trichloraethylens. Diese Flüssigkeit lässt man durch die Aluminiumoxydsäule laufen und wäscht mit 5 mal 10 ml kalten Trichloraethylens nach, ohne dass der Flüssigkeitsstrom unterbrochen wird. Das in einem tarierten Kölbchen aufgefangene Filtrat wird durch Destillation vom Lösungsmittel befreit und bis zur Gewichtskonstanz bei 105°C im Trockenschrank getrocknet.



4. Anordnung bei der Ermittlung der Ultraviolettabsorption

- a) Die Substanzen werden im Verhältnis 0.01; 0.1; 1.0 und 10.0 g in 100 ml Chloroform für die Ultraviolett-spektrographie „Merck“ gelöst. Die Extinktion E entspricht $E \frac{1\%}{1\text{cm}}$.
- b) Verwendetes Gerät: Zeiss-Opton-Spektralphotometer mit Monochromator M 4 Q.
- c) Verwendete Küvetten: 0.1 Qu und 1.0 Qu.

5. Bestimmung der Jod- und Hydroxylzahl

Die Bestimmung der Jodzahl (18) und Hydroxylzahl (19) erfolgt nach der Vorschrift der Deutschen Einheitsmethoden.

6. Die für den qualitativen Nachweis von Polyäthylenglykolen verwendeten Reagenzien


- Ammonium-Kobaltthiocyanatlösung (15 g Kobalt-II-nitrat-hexahydrat und 100 g Ammoniumthiocyanat gelöst in 385 ml Wasser)
- Anthrönlösung (0.1 g Anthron (9.10-Dihydro-9-oxoanthracen) gelöst in 99.9 g Schwefelsäure, $d = 1.83$)
- Bromwasser (DAB 6)
- Cadmiumjodidlösung (10 g Cadmiumjodid gelöst in 90 ml Wasser)
- Gerbsäurelösung (DAB 6)
- Jod-Jodkaliumlösung (verdünnte Lugolsche Lösung DAB 6)
- Jodlösung, 0.1-normal
- Kaliumbromid-Bromlösung (12 g Kaliumbromid und 0.8 g Brom gelöst in 87.2 ml Wasser)
- Kaliumferrocyanidlösung, 0.25-molar
- Kaliumpermanganatlösung, 0.1-normal
- Kalium-Quecksilberjodidlösung (Mayers Reagenz DAB 6)
- Kalium-Wismutjodidlösung (Dragendorffs Reagenz, 8 g Wismutsubnitrat werden in 20 ml Salpetersäure, $d = 1.18$, gelöst. Diese Lösung wird allmählich in eine konzentrierte wässrige Lösung von 22.7 g Kaliumjodid gegeben. Nach erfolgter Abscheidung des gebildeten Salpeters wird die Flüssigkeit vom letzteren abgossen und mit Wasser auf 100 ml verdünnt)
- Kodeinlösung (5 g Codeinum purum gelöst in 95 ml Alkohol 90 %)
- β -Naphthollösung (5 g β -Naphтол gelöst in 95 ml Alkohol 90 %)
- Natriumhydroxyd (DAB 6)

Natriumtetraphenylboratlösung (5 g Natriumtetraphenylborat gelöst in 95 ml Wasser)

Nesslers Reagenz (DAB 6)

Phenollösung (DAB 6)

Phosphor-Molybdänsäurelösung (5 g Phosphor-Molybdänsäure -




Phosphor-Wolframsäurelösung (10 g Phosphor-Wolframsäure -



Quecksilber-II-chloridlösung (DAB 6)

Reagenz nach Folin und Denis (zu einer Lösung von 100 g Natriumwolframat -



+ 2 H_2O - in 700 ml Wasser fügt man eine Mischung von 50 ml 85 proz. Phosphorsäure - H_3PO_4 - und 100 ml konzentrierter Salzsäure, $d = 1,19$. Nach 10-stündigem gelindem Kochen am Rückfluss fügt man 150 g Lithiumsulfat, 50 ml Wasser und einige Tropfen Brom zu. Dann kocht man 15 Minuten ohne Kondensor, kühlt, verdünnt auf 1 Liter und filtriert)

Resorcinlösung (5 g Resorcin gelöst in 95 ml Alkohol 90 %)

Siliko-Wolframsäurelösung (10 g Siliko-Wolframsäure - $\text{SiO}_2 \cdot 12 \text{WO}_3 + x \text{H}_2\text{O}$ - werden in etwas Wasser gelöst, mit Natronlauge (10 %) neutralisiert und mit Wasser auf 100 ml ergänzt)

Schwefelsäure (DAB 6)

Thymollösung (5 g Thymol gelöst in 95 ml Alkohol 90 %)

Trichloressigsäurelösung (50 g Trichloressigsäure gelöst in 50 ml Wasser)

Vanillinlösung (5 g Vanillin gelöst in 95 ml Alkohol 90 %)

7. Versuchsanordnung zum qualitativen Nachweis der Polyäthylenglykole mittels Natriumperjodat

0,20 g der zu untersuchenden Substanz werden in einem etwa 100 ml fassenden Schliffkolben mit aufgesetztem Rückflusskühler mit 20 ml 25 proz. Schwefelsäure 15 Minuten zum Sieden erhitzt. Der auf etwa 40°C abgekühlten Flüssigkeit fügt man 0,2 g Natriumperjodat zu. 5 ml des aus dem Reaktionsgemisch gewonnenen Destillates werden mit 5 ml Schiffs Reagenz (DAB 6) versetzt. Es ist eine rotviolette Färbung zu beobachten, die bei Polyäthylenglykolen höheren Molekulargewichts verzögert auftreten kann.

8. Versuchsbedingungen bei der Bindung von Quecksilber-II-chlorid an Polyäthylenglykol

0. 1000 g Polyäthylenglykol werden in einen 100 ml (bzw. 250 ml) fassenden Messkolben eingewogen, in etwa 20 ml destillierten Wassers gelöst und mit 0. 1-m-Quecksilber-II-chloridlösung gefällt. Nach zweistündigem Stehen wird mit Wasser aufgefüllt, kräftig geschüttelt und filtriert. Die ersten 25 ml des Filtrats bleiben unberücksichtigt, in den folgenden 50 ml wird komplexometrisch der Überschuss an Sublimat ermittelt. Zur Fällung werden benötigt bei

Polyäthylenglykol 600	150 ml 0. 1-m-Sublimatlösung
Polyäthylenglykol 1000	50 ml 0. 1-m-Sublimatlösung
Polyäthylenglykol 1500 bis 6000	25 ml 0. 1-m-Sublimatlösung.

1 ml 0. 1-m-Komplexonlösung entspricht 0. 0027152 g HgCl_2 .

Indikator: Eriochromschwarz T.

III. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden Beiträge zur Analytik von Salben und Salbengrundlagen, vornehmlich solcher, die für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das DAB 7 vorgeschlagen sind, geliefert.

Aluminiumoxyd erweist sich als geeignetes Adsorptions- und Trennmittel. Aus Lösungen werden fette Öle, die Wachsalkohole und ihre Ester, Ölsäureoleylester, sowie die Polyäthylenglykole und die polyoxaethylierten Verbindungen von einer Aluminiumoxydsäule vollständig zurückgehalten, während die flüssigen und halbfesten Kohlenwasserstoffe ungehindert hindurchlaufen. Lediglich von den Hartparaffinen verbleiben bis zu 8.5 % im Aluminiumoxyd. Auf Grund der selektiven Sorption können die Unguentum emulsificans und die Unguentum alcoholium lanæ in ihre Hauptbestandteile zerlegt werden. Die Verseifungsprodukte der untersuchten Substanzen werden quantitativ von Aluminiumoxyd festgehalten, so dass auch hier eine Trennung von den Kohlenwasserstoffen möglich ist.

Bei der Sorption von Salben und Salbengrundlagen an Aluminiumoxyd muss dessen Kapazität berücksichtigt werden. Überschreitet man die ermittelten Höchstmengen, die unter den Versuchsbedingungen zwischen 0. 04 g und 0. 9 g liegen, so findet sich im Eluat die entsprechende Salbengrundmasse in Anteilen, die bei den einzelnen Stoffen, graphisch dargestellt, einen unterschiedlichen, aber für jeden Stoff charakteristischen Kurvenverlauf ergeben.

Bei Anwendung verschiedener Lösungsmittel werden unterschiedliche Mengen an Untersuchungssubstanz von Aluminiumoxyd zur Sorption gebracht.

Die Lösungen der hier untersuchten Stoffe weisen in ihren Ultraviolettabsorptionsspektren charakteristische Maxima und Minima auf. Durch die Ultraviolett-spektrometrie können nicht nur Salbengrundlagen verschiedenen chemischen Aufbaus identifiziert werden, es kann auch zwischen solchen ähnlichen Aufbaus, wie z. B. den Kohlenwasserstoffen, die weitgehend übereinstimmende Maxima und Minima aufweisen, auf Grund der Höhe der Extinktionen unterschieden werden.

Durch Salbengrundstoffe wird der Nachweis von inkorporierten Arzneistoffen mittels der Ultraviolett-spektrometrie empfindlich gestört.

Vor und nach Durchlaufen einer Aluminiumoxydsäule weisen Lösungen von Hartparaffinen unterschiedliche Ultraviolettabsorptionsspektren auf. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sorption und Extinktion. Je grösser die Menge der von Aluminiumoxyd festgehaltenen Anteile, desto höher liegen die Extinktionen der nicht adsorbierten Kohlenwasserstoffe. Als Grund für diese Erscheinung wird das Vorhandensein von Oxydationsprodukten und ungesättigten Verbindungen erkannt.

Nicht alle in der Literatur beschriebenen Polyäthylenglykollnachweisreaktionen sind geeignet, die für die pharmazeutische Anwendung vorgeschlagenen Polyäthylenglykole mit den Molekulargewichten 200 bis 6000 nachzuweisen. Es wird ein Zusammenhang zwischen Spezifität der Reaktionen und dem Molekulargewicht der Polyäthylenglykole gefunden.

Phosphor-Wolfram-Molybdänsäure-Reagenz (Reagenz nach Folin und Denis auf Phenole) wird als neues analytisches Hilfsmittel vorgeschlagen. Sämtliche Polyäthylenglykole, sowie die beiden untersuchten polyoxaethylierten Produkte lassen sich nachweisen. Hierbei zeigt sich, dass Aussagen über den Polymerisationsgrad der Polyäthylenglykole gemacht werden können, da die verschiedenen Polyäthylenglykole und deren Derivate auf Zusatz steigender Mengen Reagenzlösung unterschiedlich reagieren.

Weiterhin lassen sich sämtliche Polyäthylenglykole und ihre Produkte auf eine neue Art zuverlässig identifizieren, indem man diese Verbindungen depolymerisiert, das entstehende Äthylenglykol in Formaldehyd überführt, diesen durch Destillation abtrennt und dann nachweist.


Bei der Betrachtung zur quantitativen Bestimmung von Polyäthylenglykolen wird festgestellt, dass die bisher gebräuchlichen Methoden ungeeignet sind, den Gehalt an Polyäthylenglykolen zu ermitteln, wenn nicht gleichzeitig das Molekulargewicht bzw. der Polymerisationsgrad bekannt sind. Studien der Anlagerungs-

fähigkeit der Polyäthylenglykole gegenüber Quecksilber-II-chlorid lehren, dass die Sublimatmengen, die von Polyäthylenglykolen verschiedenen Molekulargewichts gebunden werden, nicht mit dem von B. WURZSCHMITT ermittelten Oxonierungsgrad von 37 % in Einklang zu bringen sind.


IV. Literatur

- 1) Amerikanisches Patent 2566613
- 2) Amerikanisches Patent 2588506
- 3) Amerikanisches Patent 2644018
- 4) ASAHARA, T., Y. KONISHI, Y. KURODA und M. MASHINO,
Chromatographische Trennung von Fettsäuren, J. chem. Soc. Japan,
Ind. Chem. Sect. 54, 70 (1951) ref. Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 54,
44 (1952)
- 5) ASTM-Designation, D 1342 - 54 T
- 6) BENK, E., Eigenschaften und Nachweismöglichkeiten von Polyäthylen-
glykolen, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 54, 85 (1952)
- 7) BIRCHER, M., Aufbau, Wirkungsweise und einige Anwendungen des Zeiss-
Spektralphotometers PMQ II, Schweiz. Apotheker-Ztg. 95, 899 (1957)
- 8) BROWN, E. G. and T. J. HAYES, The Absorptiometric Determination of
Polyethyleneglycol Mono-oleat, Analyst 80, 755 (1955)
- 9) BRUENING, Ch. F., Bericht über kosmetische Cremes. - Die Bestimmung
von Kohlenwasserstoffen in Cold-Cremes, J. Assoc. off. agric. Chemists 39,
391 (1956)
- 10) CASON, J. and G. A. GILLIES, Adsorption und Chromatographie von Fett-
säuren an Tierkohle, J. org. Chemistry 20, 419 (1955)
- 11) CLEMENTS, J. E., Analyse von Lippenstiften, Soap, Perfum. Cosmet. 29,
87 (1956)
- 12) COPPINI, D. e R. CAMERONI, Kolorimetrische Bestimmung der Carbowax-
präparate und ihr Verhalten gegenüber Alkaloidreagenzien, Boll. chim.
farmac. 92, 363 (1953)
- 13) COPPINI, D. e G. GRASSI, Sui composti carbowax-iodio, Atti Soc. Natura-
listi Matematici Modena 85, 3 (1954)
- 14) CRITCHFIELD, F. E. and J. B. JOHNSON, Colorimetric Determination of
ethylene oxide by conversion to formaldehyd, Analytic. Chem. 29, 797 (1957)
- 15) CROMBI, W. N. L., R. COMBER and S. G. BOATMAN, Die Bestimmung un-
gesättigter Fettsäuren durch Verteilungschromatographie mit Phasenumkehr,
Biochem. J. 59, 309 (1955)

- 16) CROPPER, F.R. and A.HEYWOOD, Analytical separation of the methyl esters of the C_{12} - C_{22} fatty acids by vapor-phase chromatography, Nature (London) 172, 1101 (1953)
- 17) DGF-Einheitsmethoden C - III 1 b (53)
- 18) DGF-Einheitsmethoden C - V 11 a (53)
- 19) DGF-Einheitsmethoden C - V 17 b (53)
- 20) Deutsches Reichspatent 597496 und Zusatzpatent 616428
- 21) Deutsches Reichspatent 721559
- 22) FAIRBAIN, D. and R.P.HARPUR, Chromatographische Trennung geringer Mengen gesättigter C_2 - C_2 -Fettsäuren, Nature(London) 166, 789 (1950)
- 23) FINHOLT, P., Salver -En oversikt, Norges Apothekerforen. Tidsskr. 64, 321, 347 (1956)
- 24) FISCHER, K.A., G.BRANDES und W.GOHDES, Die Aromatenbestimmung in medizinischem Weissöl, Pharmaz. Ind. 19, 293 (1957)
- 25) FITELSON, J., The occurrence of squalene in natural fats, J. Assoc. off. agric. Chemists 26, 506 (1943) ref. Chem. Abstr. 38, 883 (1944)
- 26) FRANZKE, Cl., Zur Analytik in der Fettchemie, Seifen-Oele-Fette-Wachse 82, 79, 103 (1956)
- 27) FUCHS, W. und A.de JONG, Chromatographische Zerlegung von Bienenwachs, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 56, 218 (1954)
- 28) GALLO, U., Analysis of nonionic surface agents, Boll. chim. farmac. 93, 160 (1954)
- 29) GILBY, J. A. and H. W. HODGSON, A scheme of analysis for commercial detergents, Manufact. Chemist pharmac. fine chem. Trade 21, 371, 423 (1950) ref. Chem. Abstr. 45, 371, 5427 (1951)
- 30) GOMEZ, A. O. y A. S. CARTAYA, Adsorption of fatty acids from olive oil by ionexchange resins, Grasas y aceites (Sevilla) 4, 176 (1953)
- 31) GREEN, T., R. P. HARKER and F. O. HOWITT, Die Verwendung von Adsorptionssäulen bei der Analyse wässriger Ölemulsionen, Analyst 80, 470 (1955)
- 32) GREEN, T., R. P. HARKER and F. O. HOWITT, Use of Adsorption Columns in the Analysis of Emulsions stabilized with Non-ionic Detergents, Nature (London) 174, 659 (1954)




- 33) GREEN, T., F.O. HOWITT and R. PRESTON, Die Verwendung von Polythen bei der Auftrennung von Fettsäuren durch Umkehrphasen-Chromatographie, Chem. and Ind. 35, 591 (1955)
- 34) GUTTMANN, D. and T. HIGUCHI, Possible Complex Formation Between Macromolecules and Certain Pharmaceuticals X., J. Amer. pharmac. Assoc. sci. Edit. 45, 659 (1956)
- 35) HAAKH, H., O. v. CANDIE und W. MÖBUS, Über den Nachweis von Polyglykolaethern und die Wollwäsche mit Leonil O, Melliand Textilber. 32, 699 (1951)
- 36) HABERLAND, G., Spezifischer Nachweis für Aethylenglykol, Polyäthylenglykole und deren Derivate, Arch. Pharmaz. Ber. dtsh. pharmaz. Ges. 287/59; Mitt. dtsh. pharmaz. Ges. 24, 142 (1954)
- 37) HANSEN, R. P. and F. B. SHORLAND, Verzweigte Fettsäuren in Butterfett. -
1. Isolierung verzweigter Fettsäuren aus Butterfett unter besonderer Berücksichtigung der C₁₇-Säuren, Biochem. J. 50, 207 (1951)
- 38) HIGUCHI, T. and J. L. LACH, Study of possible complex formation between macromolecules and certain pharmaceuticals III., J. Amer. pharmac. Assoc., sci. Edit. 43, 465 (1954)
- 39) HOEVE, J. A. van der, Analysis of textile auxiliary products, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 67, 649 (1948)
- 40) HORN, D. H. S. and F. W. HOUGEN, Die Isolierung einiger homologer Glykole mit höherem Molekulargewicht aus dem Unverseifbaren des Wollwachses, Chem. and Ind. 31, 670 (1951)
- 41) HOWTON, D. R., Die chromatographische Trennung von Polybromfettsäureestern, Science (Washington) 121, 704 (1955)
- 42) IRISH, G. E. and A. C. KARBUM, Prinzipien der Elutionschromatographie, wie sie bei der Trennung von Schmierölkomponenten angewendet wird, Analytic. Chem. 26, 1445 (1954)
- 43) JAMINET, Fr., Die mikropapierchromatographische Trennung einiger Oxyäthylenpolymerer, J. Pharmac. Belgique 37, 318 (1954)
- 44) JOHNSTON, J. D., F. GAUTSCHI and K. BLOCH, Die Isolierung von Lanosterin aus Isocholesterin, J. biol. Chemistry 224, 185 (1957)
- 45) KAPITEL, W., Die säulenchromatographische Trennung von Fettsäuren für analytische Zwecke, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 58, 91 (1956)



- 46) KAUFMANN, H. P., J. G. THIEME und F. VOLBERT, Der Nachweis der Raffination von Schweineschmalz. II und III. Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 58, 995, 1046 (1956)
- 47) KISMARTON, K., Chromatographie der Fettsäuren, Élelmézési Jpar (Verpflegungs-Ind.) 9, 165 (1955) ref. Chem. Zbl. 128, 4500 (1957)
- 48) KREUTZKAMP, N., Über die Isolierung von Arzneimitteln aus Suppositorien und Salben, Dtsch. Apotheker-Ztg. 95, 640 (1955)
- 49) LACH, J. L., K. RAVEL and S. M. BLAUG, Study of Complex Formation by Polyethylene Glycol and Dimethylurea with Some Pharmaceuticals, J. Amer. pharmac. Assoc. sci. Edit. 46, 615 (1957)
- 50) LAPKINA, N. B. und W. A. NASARENKO, Nachweis von Aethylenglykol bei der gerichtchemischen Analyse, J. analyt. Chem. 6, 262 (1951) ref. Chem. Zbl. 123, 2232 (1952)
- 51) MARTINEZ, J. C., Analytische Chemie. - Die Perjodsäure als Gruppenreagenz in der quantitativen organischen Chemie, Quim. e Ind. (Bilbao) 2, 8 (1955)
- 52) Mc Allister, R. V. and R. J. LISK, Polyoxyethylene Stearate. Colorimetric Determination in Dilute Solutions, Analytic. Chem. 23, 609 (1951)
- 53) MIDDENDORF, L., Polyaethylenoxyde als Arzneistoffträger, Pharmaz. Ind. 16, 44 (1954)
- 54) MIYAKAWA, T., H. NOGUCHI und H. NOMIZU, Studien über Wollfett. - Die Darstellung der Methylester und von Derivaten von Fettsäuren, J. Japan Oil Chemists' Soc. 5, 149 (1956), ref. Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 58, 1005 (1956)
- 55) MODICA, G. di e P. F. ROSSI, Chromatographische Trennung von ungesättigten organischen Säuren, Chim. analytique 34, 271 (1952)
- 56) NEU, R., Der Nachweis und die quantitative Bestimmung von Polyalkylenoxyden mit Natriumtetraphenylborat, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 59, 823 (1957)
- 57) NEU, R., Die quantitative Bestimmung von 1, ω -Dihydroxypolyäthylenoxyden mit Natriumtetraphenylborat, Seifen-Oele-Fette-Wachse 84, 167 (1958)
- 58) NEWBURGER, S. H., Analysis of mixtures of hydrocarbons, beeswax and spermaceti, J. Soc. Cosmetic Chem. 1, 95 (1948)

- 59) NEWBURGER, S. H., The analysis of lanolin-hydrocarbon mixtures, J. Assoc. off. agric. Chemists 31, 670 (1948)
- 60) NIJKAMP, H. J., Eine einfache chromatographische Methode zur Bestimmung der gesättigten geradkettigen Fettsäuren mit 10 bis 20 C-Atomen, Nature (London) 172, 1102 (1953)
- 61) NOWOTNY, A., Die Extraktion von Fettsäuren aus Hydrolysaten mit Hilfe von Ionenaustauschern, Naturwissenschaften 43, 519 (1956)
- 62) OSIPENKO, F. G. und I. F. OSIPENKO, Analysis of water soluble fatty acids by chromatography on aluminium oxide, Ann. Leningrad State Univ., chem. Ser. 1954, 193, ref. Chem. Abstr. 51, 11176 (1957)
- 63) PRESTING, W. und S. JÄNICKE, Zum Nachweis polycyclischer Aromaten in Kohlenwasserstoff-Wachsen, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 60, 12 (1958)
- 64) RADLEY, J. A., Anthron als Reagenz in der Fluoreszenzanalyse sowie einige Anwendungen, J. Sci. Food Agric. 1, 222 (1950)
- 65) RAVIN, L. J., R. J. MEYER and T. HIGUCHI, Chromatographic Analysis of Mixtures of Mono-, Di-, And Tristearin Containing Mineral Oil, J. Amer. Oil Chemists' Soc. 34, 261 (1957)
- 66) REICHERT, B., Die Ausmittlung von Arzneistoffen und Giften aus „Postonal“-haltigen Zubereitungen, Dtsch. Apotheker-Ztg. 56, 233 (1941)
- 67) SALZMANN, O., Salben und Salbengrundlagen im Nachtrag zum DAB 6, Fette Seifen einschl. Anstrichmittel 59, 361 (1957)
- 68) SCHNURMANN, R., P. M. MARTIN and W. F. MADDAMS, An Ultraviolet Spectrophotometric Quality and Stability Criterion for Medicinal Liquid Paraffin, J. Pharmacy Pharmacol. 3, 298 (1951)
- 69) SCHÖNFELDT, N., Quantitative Bestimmung von Aethylenoxydprodukten in wässrigen Lösungen und Dispersionen, Nature (London) 172, 820 (1953)
- 70) SCHÖNFELDT, N., A Method for the Quantitative Determination of Ethylene Oxide Adducts in Their Aqueous Solutions or Dispersions, J. Amer. Oil Chemists' Soc. 32, 77 (1955)
- 71) SHAFFER, C. B. and F. H. CRITCHFIELD, Feste Polyaethylenglykole (Carbowax-Verbindungen). - Quantitative Bestimmung in biologischen Materialien, Analytic. Chem. 19, 32 (1947)
- 72) SIMMONS, R. O. and F. W. QUACKENBUSCH, Chromatographic separation of unsaturated fatty acids as their 2, 4-dinitrobenzenesulfonyl chloride derivative, J. Amer. Oil Chemists' Soc. 30, 614 (1953)



- 73) SPENGLER, G. und G. HAUF, Über die Adsorptionsmethode von Wachsen und Paraffinoxidationsprodukten, *Fette Seifen einschl. Anstrichmittel* 57, 474 (1955)
- 74) SPENGLER, G. und G. HAUF, Über die Zerlegung von Kohlenwasserstoffgemischen mit Hilfe adsorptiver und präparativer Methoden und deren Anwendung auf Wachse, *Fette Seifen einschl. Anstrichmittel* 59, 509, 607 (1957)
- 75) SPENGLER, G. und E. WÖLLNER, Adsorptive Trennung von Wachsen und Wachskomponenten, *Fette Seifen einschl. Anstrichmittel* 56, 775 (1954)
- 76) SPENGLER, G. und E. WÖLLNER, Eine neue Paraffinbestimmungsmethode von Wachsen und Wachsverschnitten, *Fette Seifen einschl. Anstrichmittel* 57, 5 (1955)
- 77) SPRINGER, R., Trennung der Bestandteile von Salbenzubereitungen, *Arch. Pharmaz. Ber. dtsh. pharmaz. Ges.* 290/62, 41 (1957)
- 78) SPRINGER, R. und R. HERZINGER, Aufteilung der Bestandteile des Unverseifbaren in Salbengrundlagen mittels eines Adsorptionsverfahrens, *Arch. Pharmaz. Ber. dtsh. pharmaz. Ges.* 289/61, 418 (1956)
- 79) STEVENSON, D. G., Absorptiometric Determination of a nonionic detergent, *Analyst* 79, 504 (1954)
- 80) TRAPPE, W., Die Trennung von biologischen Fettstoffen aus ihren natürlichen Gemischen durch Anwendung von Adsorptionssäulen I und II, *Biochem. Z.* 305, 150 (1940) und 306, 316 (1940)
- 81) ULLMANN, E., Die oberflächenaktiven Synthetika, ihre biologische Wirksamkeit und ihre Bedeutung für die pharmazeutische Technik. *Arzneimittelforschung* 4, 88 (1954)
- 82) VELON, P. e G. MEDYNSKI, Determination of hydrocarbons (in cosmetics) by chromatography and selective solubility, *Ind. Parfumerie* 7, 198 (1952)
- 83) VELON, P. e G. MEDYNSKI, Bestimmung der Kohlenwasserstoffe in Cremes, *Riv. ital. Essenze, Profumi, Piante officin., Olii veget. Saponi* 34, 345 (1952)
- 84) WANKMÜLLER, A., Zur Analytik pharmazeutisch verwendeter Polyaethylenoxyde, *Pharmaz. Zentralhalle Deutschland* 88, 308 (1949)
- 85) WARSHOWSKY, B. and P. J. ELVING, Gleichzeitige Bestimmung von Aethylen- und 1,2-Propylenglykol, *Ind. Engng. Chem. analyt. Edit.* 18, 253 (1946)
- 86) WURTZ, A., Synthese des Glycols aus Aethylenoxyd und Wasser, *Comptes rend.* 49, 813 (1859)
- 87) WURZSCHMITT, B., Systematik und qualitative Untersuchung capillaraktiver Substanzen, *Z. analyt. Chem.* 130, 105 (1950)

V. Übersichtstabellen

Tabelle 1

Zusammenstellung der Salben und Salbengrundlagen,
die für einen Nachtrag zum DAB 6 und für das
DAB 7 vorgeschlagen sind.

Vorgeschlagene Bezeichnung	Zusammensetzung (beispielsweise)	Löslichkeit						Reaktion in 25° (unter Schütteln)	Reaktion in 100° (unter Schütteln)	Unverändert bleibende Substanz (alk. Versetzung)
		Wasser	Äther	Benzol	Triäthyläther	Äther	Äther			
Paraffinum durum Hartparaffin 52/54	Gewöhnliches festes, gesättigtes Kohlenwasserstoffe	unlös.	schwer löslich	leicht löslich	schwer löslich	löslich	löslich	1,1	-	100 99,7
Paraffinum durum Hartparaffin 60/62	Gewöhnliches festes, gesättigtes Kohlenwasserstoffe	unlös.	schwer löslich	leicht löslich	schwer löslich	löslich	löslich	0,55	-	100 99,8
Paraffinum por-liquum Hardparaffin 66/68	Bewährte flüssige Mischung gesättigter Kohlenwasserstoffe	unlös.	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	0	1,4640	100 100
Paraffinum sub-liquum Hardparaffin 68/70	Gewöhnliche flüssige Mischung gesättigter Kohlenwasserstoffe	unlös.	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	0	1,4750	100 100
Paraffinum album (Paraffinum molle album) weiches Paraffin	Gewöhnliche und ge-wöhnliche gesättigter Kohlenwasserstoffe	unlös.	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	0	1,4756	100 100
Paraffinum flavum (Paraffinum molle flavum) gelbes Paraffin	Gewöhnliche und ge-wöhnliche gesättigter Kohlenwasserstoffe	unlös.	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	leicht löslich	0	1,4776	100 100
Polyäthylenglykole Polyäthylenglykole 200	Kondensationspolymer des Äthylenglykols mit Wasser	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4538	0 0
Polyäthylenglykole 300		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4567	0 0
Polyäthylenglykole 400		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4584	0 0
Polyäthylenglykole 600		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4611	0 0
Polyäthylenglykole 1000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4621	0 0
Polyäthylenglykole 1500		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4631	0 0
Polyäthylenglykole 2000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4641	0 0
Polyäthylenglykole 3000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4651	0 0
Polyäthylenglykole 4000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4661	0 0
Polyäthylenglykole 6000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4671	0 0
Polyäthylenglykole 8000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4681	0 0
Polyäthylenglykole 10000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4691	0 0
Polyäthylenglykole 15000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4701	0 0
Polyäthylenglykole 20000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4711	0 0
Polyäthylenglykole 30000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4721	0 0
Polyäthylenglykole 40000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4731	0 0
Polyäthylenglykole 50000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4741	0 0
Polyäthylenglykole 60000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4751	0 0
Polyäthylenglykole 80000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4761	0 0
Polyäthylenglykole 100000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4771	0 0
Polyäthylenglykole 150000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4781	0 0
Polyäthylenglykole 200000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4791	0 0
Polyäthylenglykole 300000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4801	0 0
Polyäthylenglykole 400000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4811	0 0
Polyäthylenglykole 500000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4821	0 0
Polyäthylenglykole 600000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4831	0 0
Polyäthylenglykole 800000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4841	0 0
Polyäthylenglykole 1000000		sehr leicht löslich	prakt. unlös.	prakt. unlös.	sehr leicht löslich	sehr leicht löslich	prakt. unlös.	1,0	1,4851	0 0
Polyäthylenglykole										

Tabelle 3

Zusammenstellung der in der Literatur aufgeführten Polyäthylenglykollnachweise

a) Qualitative Nachweise.

Reagenz	Untersuchtes Polyäthylenglykol	Verfasser
Heteropolysäuren Tannin	ohne Angabe	C. Schöller, G. Schwen, G. Krämer (21)
Kaliumquecksilberjodid Kaliumwismutjodid Jod-Jodkaliumlösung Nesslers Reagenz Cadmiumjodid Quecksilber-II-chlorid Resorcin-Schwefelsäure Thymol-Schwefelsäure β -Naphthol-Schwefelsäure	Postonal (Molekulargewicht etwa 2400)	B. Reichert (66)
Silbernitratlösung Bromwasser 0,1-n-Jodlösung 0,1-n-Kaliumpermanganatlösung	Lanogen O	A. Wankmüller (84)
Ammoniumkobalthiocyanat	ohne Angabe	J. A. van der Hoeve (39)

Nitroprussidnatrium-Piperidin	ohne Angabe	J. A. Gilby und H. W. Hodgson (29)
Kaliumbromid-Bromlösung	alle Polyaethylenglykole	B. Wurzschnitt (87)
Natriumhydroxyd Trichloressigsäure Kodein-Schwefelsäure Vanillin-Schwefelsäure Pyrogallol-Schwefelsäure β -Naphthol-Schwefelsäure	ohne Angabe	E. Benk (6)
Kaliumwismuthodanid	ohne Angabe	U. Gallo (28)
Papierchromatographie	Polyaethylenglykol 300, 400, 1540, 4000 und 6000	Fr. Jaminet (43)
Phenol	Postonal	L. Middendorf (53)
Schwefelsäure-Sublimatlösung	alle Polyaethylenglykole	G. Haberland (36)
Phenol-Thiosulfat	alle Polyaethylenglykole	D. E. Guttmann und T. Higuchi (34)

Die Polyaethylenglykohnachweise sind in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie zeitlich publiziert wurden. Sich wiederholende Reagenzien sind jeweils nur bei dem Autor aufgeführt, der sie zuerst erwähnt.

Tabelle 3

b) Quantitative Bestimmungen

Reagenz	Untersuchtes Polyaethylenglykol	Verfasser
Phosphor-Molybdänsäure Siliko-Wolframsäure (gewichtsanalytisch und kolorimetrisch)	feste Polyaethylenglykole	C. B. Shaffer und F. H. Critchfield (71)
Kaliumferrocyanid + Eisen-III- chlorid + Oxalsäure (kolorimetrisch)	Polyaethylenglykol 1500 und 4000	D. Coppini und R. Cameroni (12)
0, 1-n-Jodlösung (jodometrisch)	Polyaethylenglykol 1500 und 4000	D. Coppini und G. Grassi (13)
Phenyläethylbarbitursäure (massanalytisch)	Polyaethylenglykol 4000 und 6000	T. Higuchi und J. L. Lach (38)
p-Aminobenzoesäure o-, p-, m-Hydroxybenzoesäure u. a. (massanalytisch)	Polyaethylenglykol 4000 und 6000	J. L. Lach, K. Ravel und S. M. Blaug (49)
Natriumtetraphenylborat (gewichtsanalytisch)	Polyaethylenglykol 4000	R. Neu (56)
Natriumtetraphenylborat	Polyaethylenglykol	R. Neu (57)

(gewichtsanalytisch)	300 bis 12000	
Phosphor-Molybdänsäure + Schwefelsäure (kolorimetrisch)	ohne Angabe	D. G. Stevenson (79)
Perjodsäure	ohne Angabe	J. C. Martinez (51)
Amylosefraktion der Kartoffel- stärke (kolorimetrisch)	Polyaethylenglykol- stearat	R. V. Mc. Allister und R. J. Lisk (52)
Ammoniumkobaltthiocyanat (kolorimetrisch)	Polyaethylenglykol- monooleat	E. G. Brown und T. J. Hayes (8)
Kaliumferrocyanid + Zinksulfat (massanalytisch)	Aethylenoxyd- Addukte	N. Schönfeldt (69, 70)
Resorcin-Traubenzucker (gewichtsanalytisch)	Polyglykolaether	H. Haakh, O. v. Candie und W. Möbus (35)

Tabella 4

Verhalten von Polyäthylenglykolen unterschiedlichen Molekulargewichts
gegenüber Nachweisreagenzien.

Reagenz	Poly- äthyl- glykol 200	Poly- äthyl- glykol 500	Poly- äthyl- glykol 400	Poly- äthyl- glykol 600	Poly- äthyl- glykol 1000	Poly- äthyl- glykol 1500	Poly- äthyl- glykol 2000	Poly- äthyl- glykol 3000	Poly- äthyl- glykol 4000	Poly- äthyl- glykol 5000	Ungt. poly- äthyl- glycol (Lenogen 1500)	Ungt. poly- äthyl- glycol (ipse paratum)	Sorbi- tanum mono- oleicum polyox- polyox- äthyl- latum	Öl- ricin- polyox- äthyl- latum
Siliko- Wolfram- säure	→				schwach rosa bis weisser, flockiger Niederschlag									
Phosphor- Wolframsäure	→				gelber, flockiger Niederschlag									
Phosphor- Wolframsäure	→				weisser, feinflockiger Niederschlag									
Gerbsäure- Lösung	Kognatsbraune Färbung		helle, braune Fällung						weisse, feinflockige Fällung				Kerst bei Über- schuss weisser, flockiger Niederschlag	
Gerbsäure- Natrium- hydroxyd	→								Gelbroie Trübung				Dunkelrote Färbung	
Kalium- bichsalber- jodid	-			starke Opales- zenz			weisser bis gelblich-weisser Niederschlag						gelbliche starke Opales- zenz	
Kalium- Wismutjodid	→						Rostbraune Fällung							
Jod- Jodkalium- Lösung	→				grunschwärze Fällung				rostbraune Fällung			grunschwärze Fällung	-	
Nedlers Reagenz	→								gelblich-weisser Niederschlag					
Nedlers Reagenz in der Wärme	→				grunschwärzer Niederschlag		gelb- grüner Nieder- schlag		grünlicher Niederschlag		gelber Nieder- schlag	grüner Nieder- schlag	grünsschwärzer Niederschlag	
Cadmium- Jodid- Lösung + Kalium- chlorid	→				weisser, flockiger Niederschlag		gelber, flockiger Nieder- schlag		weisser, flockiger Niederschlag		gelblich- weisser, flockiger Nieder- schlag	gelber, flockiger Nieder- schlag	gelber, flockiger Nieder- schlag	weisser, flockiger Nieder- schlag
Nachsilber- II-chlorid	erst bei grossem weisse Fällung								weisser Niederschlag				stark opaleszieren- de Trübung	
Resorcin- Schwefel- säure	orangefarbene Färbung						gelborangerote Färbung				orangefarbene Färbung		gelborangerote Trübung	

8-Naphtol-Schwefelsäure	rosa Färbung	Schwefelsäure	rosa Trübung	rosa Färbung	rosa Färbung	hellrosa Trübung
Bromwasser	-	-	schwache Trübung	orange rote Trübung	-	-
0,1-n-Jod-Lösung	-	grün schwarze Fällung	-	braunrote Fällung	grün schwarze Fällung	-
0,1-n-Kaliumpermanganat-Lösung	-	wird nicht entfärbt	-	Entfärbung	wird nicht entfärbt	Entfärbung
Ammonium-Kobalthio-cyanat	rotviolette Färbung	blau-violette Färbung	-	himmelblaue, feinflockige Fällung	-	-
Kalium-bromid Brom-Lösung	-	-	-	orangegelber Niederschlag	-	-
Natrium-hydroxyd	-	beim Erhitzen keine Trübung	-	beim Erhitzen starke Trübung	beim Erhitzen keine Trübung	beim Erhitzen starke Trübung
Trichlor-essigsäure-Lösung 50 %	-	Erst bei Überschuss weisse, feinflockige Fällung	-	weisse, feinflockige Fällung	Erst bei Überschuss weisse, feinflockige Fällung	weisse, feinflockige Fällung
Äol-ein-Schwefelsäure in der Wärme	Schwarzbraune Färbung	-	-	dunkelrote Färbung	-	bräunliche Färbung Trübung
Vanillin-Schwefelsäure	-	beim Unterschichten roter Ring, nach Umschütteln dunkelrote bis violette Färbung	-	-	-	beim Unterschichten roter Ring, nach Umschütteln himbeerrot, dann blau-violett
8-Naphtol-Schwefelsäure	-	himbeerrote Trübung	altrosa bis weisse Trübung	braunrote Trübung	himbeerrote Trübung	weisse bis rosa Trübung
Phenol-Lösung	-	-	-	milchige Trübung	-	blaugraue Opaleszenz
Kalium-ferrocyanid	weisse, feinflockige Fällung	-	-	weisse, flockige Fällung	-	gelbliche, weisse, feinflockige Fällung
Natrium-tetrachlorborat	-	-	-	weisser, flockiger Niederschlag	-	-
Reagenz nach Folin und Denis	erst bei Überschuss gelber, flockiger Niederschlag, nach Umschütteln gallertig	-	-	gelber Niederschlag, nach Umschütteln gallertig	-	erst bei Überschuss gelber, flockiger Niederschlag, nach Umschütteln gallertig
Anthrone-Lösung	-	-	weisser, feiner Niederschlag	-	-	opaleszierende Trübung

Lebenslauf

Am 20. Dezember 1927 wurde ich als zweites Kind des Apothekers Emil Weigand und seiner Ehefrau Lina, geb. Braun, in Stuttgart geboren. Meine Kindheit verlebte ich in Vaihingen an der Enz, wo sich mein Vater als Apothekenbesitzer niedergelassen hatte.

Von Ostern 1934 bis Ostern 1938 besuchte ich die Volksschule in Vaihingen/Enz und anschliessend die Oberschule für Jungen daselbst. Im Februar 1944 wurde ich als Luftwaffenhelfer eingezogen. Von September 1944 bis Ende Oktober 1944 genügte ich meiner Arbeitsdienstpflicht in Posen. Am 1. Dezember 1944 wurde ich von der deutschen Wehrmacht übernommen. Während eines Sonderkommandos in Dänemark kam ich Anfang Mai 1945 in englische Kriegsgefangenschaft.

Nach meiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945 war ich auch gesundheitlichen und familiären Gründen längere Zeit im Elternhaus. Da es nicht möglich war, an der Vaihinger Oberschule das Abitur abzulegen, besuchte ich die Klassen 6 bis 8 der Oberrealschule in Ludwigsburg, der Zeppelin-Oberschule in Stuttgart und der Oberschule in Pfarrkirchen Niederbayern. Von Oktober 1950 bis März 1951 nahm ich an einem Kriegsteilnehmerkurs an der Oberrealschule in Rosenheim teil, wo ich das Abitur ablegte.

Im April 1951 begann ich meine zweijährige Lehrzeit in der Apotheke meines Vaters. Ende März 1953 bestand ich das pharmazeutische Vorexamen und begann im Mai 1953 mit dem Studium der Pharmazie an der Universität Tübingen. Daselbst legte ich mein Staatsexamen am 14. Mai 1956 ab. Am 3. Juni 1957 erhielt ich die Bestallung als Apotheker.

Von Oktober 1956 bis Oktober 1958 widmete ich mich vorliegender Dissertationsarbeit, die unter Leitung von Herrn Professor Dr. Rudolf Springer stand.

Das ist, dass wir nicht nur die Sache selbst, sondern auch die Art und Weise, wie sie behandelt wird, betrachten müssen. Wir müssen uns fragen, ob die Behandlung der Sache in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt.

Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt. Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt.

Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt. Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt.

Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt. Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt.

Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt. Wir müssen uns also fragen, ob die Entscheidung in der Tat die besten Interessen der Beteiligten fördert, oder ob sie nur die Interessen derjenigen, die die Entscheidung treffen, befriedigt.

e
th
e
ll
ti
n
n
e